













Cours de Maladies
Veneriennes Par M^r Catteris
Chirurgien Des capucins
A Capucines De Paris.





La maladie vénérienne est une maladie contagieuse gagnée par le contact de parties couvertes d'un léger épiderme cette définition ne nous donne pas une idée bien précise. C'est la gale qui peut aussi être contagieuse. puis la maladie vénérienne attaque plusieurs parties du corps. il n'y a donc que sa description et celle de ses symptômes qui puissent donner une idée exacte.

Dès sa première apparition se présentait sous la forme de pustules par opposition à la petite vérole. lui donna le nom de grosse vérole puis elle a perdu son épithète. on la nomma appelée rogne &c.

A cette époque les français avaient fait la conquête de l'Italie. comme les vainqueurs sont toujours odieux pour le vaincu d'esp les italiens donnaient et attachent à cette maladie le nom de mal français. c'est là qu'on eut pour la première fois le nom de mal de naples &c. gaspard forcella crut qu'elle était originaire de leur pays. peut-être l'avait-il vu d'abord en cette province. quoiqu'il en soit il lui en donna le nom. Les africains les habitants de la mauritanie l'appelaient le mal arabe et en général on lui donna des noms différents suivant les peuples dont on croyait tenir la source. On l'appela maladie de venus maladie vénérienne

maladie vénérienne parce qu'on se était tenté d'en être affecté en attaquant les parties de la génération, ou bien parce qu'on cacheait cette affection ou les faisaient aussi traiter secrètement. frascato a fait un homme on il en explique l'origine. il suppose que l'homme qui a été le premier attaqué était le berger syphilis et d'où vient le nom de maladie syphilitique.

C'est en 1494 que la maladie a fait son entrée en France. on se contentait d'une gonorrhée ou seulement

en Europe. On conjecturement sa. tous les auteurs est la la-
piter d'une maladie comme en passant; soit par mutations
en une autre maladie; et elle été apportée des nouveaux
mondes?

Dans son commencement la maladie n'affectait que
les téguments, ne se présentait que par la forme de
puistules aux parties de la génération ensuite elle
devenait Conscutiva et affectait toutes les parties du
corps. 1495

Le premier auteur qui en ait parlé est leonicenus en 1498
il avait observé que les puistules se faisaient sentir inter-
ieurement et que quand les douleurs étaient vives des
éruptions natatoires pas complètes et reciproquement...
il n'explique pas d'ailleurs quelle était cette éruption.
il parle aussi de tumeurs aux aisselles et aux aines, aux
et donne le nom de bubons mais il n'indique pas s'elles
touchent à la maladie vénérienne ou bien à ce qui se
voit dans les maladies adynamiques. Il compare cette
maladie avec l'éléphantiasis et autres maladies
cutanées et il en résulte, dit-il, que c'est une
maladie cutanée nouvelle qu'il attribue à la
dégraderation des humeurs.

en 1497

adit à peu près le

même chose que leonicenus mais il observe que c'est
par la communication des deux sexes que la maladie
vénérienne se propage

en 1498

Leobastianus qui décrit les mêmes
symptômes. Cette maladie cutanée seulement
consistait en des puistules des élévations sur les
parties génitales et qui de là se portaient sur les
reste du corps. Leonicenus avait vu cette maladie
en rapport avec l'éléphantiasis de la lèpre. celui-ci
dit que c'est une modification de la lèpre de
l'éléphantiasis du premier &

4.

un charvère qui déterminé de les docteurs quand l'urine passe? on croirait d'abord qu'il parle de la gonorrhée, mais après on lit les autres contemporains on croit que c'est peut-être que de charvères, ainsi c'est en certains d'autant plus que au vers qu'en 1551 qu'il qu'il est question de la gonorrhée d'une manière bien positive.

en 1518 Ménard de verone ne parle pas de la maladie du canal de l'urètre, apparemment qu'il y avait eu des gonorrhées de cette époque il en aurait dit quelque chose. il parle de la flux de verrues, de pourceaux, de végétations en forme de choux fleurs et c'est là les 3 qui parle de ces 3 symptômes. il dit aussi que quelquefois les ulcères se portaient à l'arrière-bouche qu'il y avait extinction de voix que les cartilages se cariaient de la diffinité pour les prononciations de son, pour les desputations &c

en 1530 parut le poème de fructosus qui a si bien décrit les symptômes qui lui étaient connus. il ne parle pas seulement par l'urètre, ainsi il ne devait pas avoir rien pour lors. il décrit poétiquement tous les autres symptômes dont les prédécesseurs avaient parlé il parle encore de bubons inguinaires & il est à présumer qu'il a eu vu cette maladie quand il dit inguen edobat. c. ad. qu'un ulcère songeait d'aine. il paraît qu'il ne connaissait que les bubons ulcérés

en 1536 nicolas massa med. italien qui décrit très au long tous les symptômes dont on vient de parler qui parle de tout ce qui

5 qui parle des plusieurs maladies anciennes qu'il a guéries
dans donne les raisons, a bien indiqué les remèdes qui
conviennent à la maladie récurrente et à la mesure les
indiqués, ainsi toujours ad ministrés. ^{ad ministrés} ^{seulement} les préceptes
il ne peut pas en dire. Devenu récurrent, il
a décrit le bubon enorgé et ulcéré, mais il écrit que
le bubon est la symptôme critique de la maladie récurrente
qu'on croyait avoir son siège dans la foie et de la maladie
le portait au pite dans les aines par la tige cellulaire
circulaire qui a duré un demi siècle.

en 1538 alphonse fari ital. ajoute à la description
de la mal. vén. un symptôme qui fut ensuite très
commun, c'est la chute des poils des cheveux de la barbe
symptôme qui devint ensuite général de sorte qu'on dit
quelques on se rase la tête et la barbe... pelades &c.
on en parle encore au 17^e siècle mais c'était
déjà rare depuis 18 ans il n'en a vu que 9 ou 10
exemples et encore tous les cheveux tombaient et
manquaient très certainement que partait.

en 1542 aut. le cog dans son traité de maladies
véneriennes n'a fait rien de neuf seulement il
a écrit mieux le bubon de aine, récurrent de aine
et lui donne le nom de poulain.

en 1551 antoine musc brasseur de aple de leuicany
dans son traité de maieba gallica en décrit bien tous
les symptômes c'est lui et autheur qui ont fait mention
d'une manière, bien particulière de l'écoulement d'un
canal de prothra... on croyait qu'il était un
écoulement de matière fécale, on fut bien
détrompé mais le nom s'est conservé, on lui a
substitué dans les derniers temps le nom de bleuorhée
qui ne convient pas, quoiqu'il y en ait quelques
noms, on l'appelle aussi chueda = gissa = percaque
quand il est inflammatoire l'écoulement fut
beaucoup plus fort. Si brasseur avait observé qu'il
était récurrent il n'aurait pas ignoré qu'il y avait

il n'est pas vénérien mais qu'étant contagieux il pouvoit
passer d'un individu à l'autre. enfin on crut que c'était
une branche venue d'Italie de la maladie vénérienne
d'un, ce dernier, temps on a prétendu que tous les
écroulements étoient exempts de virus vénériens, et que les
gonorrhées ne pouvoient produire que la gonorrhée, mais
de même qu'il est faux que toutes gonorrhées soient vénériennes
de même il n'est pas vrai qu'elles ne le fassent jamais.

en 1555. Jarricot parle de différents écoulements seulement
il les fait venir de l'intérieur du bas ventre de l'uretre &c.
il donne contre la mercuriale et toutes les préparations
on attribua à cette époque le sort de l'écoulement par
les autres chirurgiens avoient trop posé la friction.
on dit qu'un d'ay avoit déclaré qu'il étoit
davis que son maître fut guéri comme les derniers
rois de son royaume.

en 1556. Baccus Baccardinus Thomassinus parle
d'un nouveau symptôme le tartarum doreille, affec-
tion fréquente à cette époque et qui le devint ^{plus} commun
dans la suite bruyamment parait à celui que
produit le son d'une cloche on dit qu'un Lombard
tintement et mouvement confus. sur le cou ou
région de l. quand certaines parties comme les
voies du palais de la glotte &c. font de bruits
on peut éprouver ce symptôme; ainsi le pour ait
c'est être pour un symptôme direct de la maladie
vénérienne.

Quelle peut être la cause de la maladie
vénérienne, comment a-t-elle commencé? il y a
3 opinions parmi les auteurs. Les uns ont dit qu'elle
étoit née en Italie vers 1494 d'autres qu'elle
étoit une modification des maladies
antérieures. D'autres enfin, que le nouveau monde
ayant été découvert lorsque la maladie a paru
elle en tirait sa source.

Les uns ont attribué la maladie aux astres, à leur
remonte malheureuse et ce sont presque tous
auteurs qui en ont parlé d'abord...

La seconde opinion est celle des auteurs qui rapportent
tout à la divinité, ont dit que la maladie a été envoyée
par les vengeurs des hommes de leur libertinage. Or, si les
pluspart des auteurs italiens presque tous les espagnols, peu
de français, ont été de cette opinion.

D'autres ont pensé que la maladie tirait son origine
de ceit de gros singes avec des femelles, ou de la même avec
des singes femelles. Cette opinion n'est fondée sur aucun
fait, Van-helmout a prétendu 1640 que c'était par
de ceit d'un homme avec une femme il a dit cela
sur des traditions orales, qui n'ont aucun degré de
probabilité. Sie ravelin a prétendu depuis que le
néapolitain pour se venger des français leur avaient
fait manger de la chair humaine cuite en patte... pour
le rapport de certains vieillards. Il rapporte avoir
nourri un chien avec de la chair d'un chien et
que le peu lui avait présenté des pustules semblables à celles
qui se trouvaient sur ceux qui avaient alors la maladie
vénéreuses. Ces expériences ont été répétées sans offrir
le même résultat.

en 1640 jéru mandan a prétendu que la maladie
devait son origine à la cohabitation d'un
chevalier romain avec une courtisane qui avait
la lèpre à une époque où elle avait ses règles épaisses
ou son affection syphilitique était extrêmement
développée. que bientôt après l'accouchement il eut
une irritation à la verge qui se porta à l'habitude
du corps. il peut bien se faire que la maladie
vénéreuse ait passé d'une lèpreuse à un
chevalier sans qu'il soit prouvé que la lèpre
ait pu produire la maladie vénéreuse. Cette
cette opinion de mandan est aussi celle
de mathole.

aurait Celsus regarda la maladie comme une
vengeance des, italiens et des espagnols qui donnerent
a Louis ~~14~~ aux français de s'en venger
mêlé du sang humain

Cirant lors de l'éruption de la maladie, menant
en europe il y eut des grandes inondations de cancrs
que les fibres étant débordé le sang venant tout au
1er étage &c on n'a pas manqué d'attribuer la maladie
aux emanations terrestres-aquatiques

Dès l'origine de la maladie 40 auteurs ont pensé
qu'il s'agit d'une suite de maladies antérieures.

L'éléphantiasis était une maladie cutanée qui
consistait dans l'engorgement des tégumens cellulaires cutanés et
sous cutanés. quelquefois les membres avaient le double
du quadruple de leur volume ord^{re} la surface de
la peau ressemblait assez à celle de léopards, des arbrs, et
de l'écorce quelquefois accompagnée d'ulcérations.

La lèpre qui y avait tant de rapport que
les auteurs ont confondu ne présentait de différences
de l'ore qu'en ce que dans la lèpre il y avait presque
toujours des ulcérations des exfoliations au lieu que
certaines fois rare dans le 1er cas, il y avait une
division de l'hôpital deux consacrées à ces 2 maladies

La lèpre était un ulcère qui rongait tantôt
d'un côté tantôt de l'autre. - Le volume &c
Les auteurs ont donc prétendu que
ces 2 divers maladies avaient subi une modification
et que la maladie nouvelle était devenue conta-
gieuse par le coït. or, la maladie n'aurait été
qu'une maladie qui quelquefois ne commençait
par envahir les organes de la génération ainsi une
maladie cutanée avait pu être et pouvait
être ulcéreuse ressemblait beaucoup à
L'éléphantiasis. il est vrai qu'il n'y avait
point d'association à la lèpre & l'éléphantiasis.

9. Différence majeure qu'il a observé, cependant quelquefois on voit des pustules où il y a surcroisement dans les tissa-cellulaires et il y a souvent plus de 2 différences entre une pustule d'un rivier et une autre qu'il n'y en avait alors entre les lèpre l'éléphantiasis & la maladie vénérienne. puis à l'apparition de la maladie vénérienne les autres maladies cutanées ont le font dissiper. ainsi la lèpre l'éléphantiasis ont disparu presque totalement. Il n'a vu que deux exemples de la 2^e maladie... il a vu des lèpre, mais avec telle qu'elle ont été décrits par les auteurs qui en ont vu beaucoup. Voilà 3 raisons très-plausibles pour regarder la maladie ven. comme une modification & considérant la chose qu'une probabilité.

une 3^e opinion est celle de ceux qui regardent la maladie vénérienne comme originaire de l'Amérique. Christophe Colomb partit d'Europe au mois d'août 1492. il revint de St. Domingue en 1495. il descendit à Hispaniola et vint débarquer au port de l'Anse-au-Fort. Il avait apporté la maladie vénérienne. Il est à présent connu qu'elle aurait dû commencer ses ravages au lieu où il séjourna quelque temps car on voit que les malades quand ils arrivent dans un port tombent ordinairement par les femmes qu'ils voient... il entra ensuite à Hispaniola. Il fut fait par le roi d'Espagne qu'il y resta neuf jours. il y avait dans cette ville 25000 habitants. aussi bien qu'aujourd'hui... cependant aucun auteur ne dit que la maladie vénérienne ait commencé par Colomb. Colomb a séjourné 21 jours à Barcelonne. de là il s'en va au roi d'Espagne... on prétend qu'il arriva un mois dans cette dernière ville. il fut ensuite à Barcelonne se trouvant toute l'Espagne. Il séjourna quelque temps à Barcelonne. il n'y a aucun auteur qui ait dit que la maladie vénérienne ait commencé par Colomb. et aucun qui ait dit que Colomb soit le premier à l'avoir introduite sur la route... ces arguments sont si-

10. fort qu'on a dit que ce n'était que dans son second voyage que Colomb avait fait présent au taurape de la maladie vénérienne. Colomb resta deux ans en voyage car il ne revint d'Amérique qu'à la fin de 1495. Il amena avec lui 250 soldats en Espagne. Il y en eut qui s'en furent à terre, mais lors qu'ils la fin de 1495, à la fin de l'été au 15 Compagnons de voyage de Colomb, moururent, qu'ils venaient arriver en Amérique, en 1494 ou au commencement de 1495 mais on ne peut pas en être sûr. mais on dit que plusieurs soldats revinrent avec Christophe ayant pris parti dans l'armée espagnole. Cette année navrée en Italie qu'à la fin de 1495 ainsi les espagnols n'ont pu communiquer avec les français qu'à la fin de 1495 au commencement de 1496 ou les auteurs disent que les symptômes de la maladie vénérienne ont commencé en 1494 ou si la maladie existait à la fin de cette année elle n'a pu venir d'Amérique. Les historiens qui ont rapporté la campagne de Charles VIII ont dit la même chose. L'arrêt du parlement rendu en 1497 parle d'une maladie qui regnoit depuis plus de deux ans... on a dit que la maladie était venue d'Amérique mais d'autres auteurs ont dit que c'était parce que les européens l'avaient apportée.

Symptômes de la maladie vénérienne

1^o avec solution de continuité

charcéri. on a appelé aussi une solution de continuité qui survient à des parties ou lepidorume a peu d'épaisseur et qui paraît être la suite d'une maladie vénérienne. on lui a donné le nom

De ~~de~~ cancrum cancris caractere parce qu'il y avait
Des ulcères rouges comme les cancris. ces ulcères ont été
appelés beniens quand il n'y avait point de douleurs ni de
rougeurs ou autres complications malins quand il y avait douleurs
inflammation, &c. & qu'ils étaient difficiles à guérir
ensuite on les a distingués en inflammatoires et en
indolens. en confluents et en filiformes, en statés nares
et en mobiles et rouges quand ils se réunissent touchent
ou bien quand ils se cicatrisent. D'un côté et font des
progrès de l'autre gagnant. D'un côté & qu'ils perdent
de l'autre.

Ils ont été ensuite divisés en primitifs et en
Consentifs... Les primitifs sont ceux qui paraissent par
d'eux après le contagium contagieux; ainsi d'après 4 jours
jusqu'à un mois... Les Consentifs sont ceux qui
paraissent après des chancres primitifs guéris soit spontanément
soit par quelques moyens médicamenteux ou bien qui ne se forment
que quelques mois après le contagium.

Le siège des chancres est pour ainsi dire toute
l'habitude du Corps, cependant quelques parties y sont plus
exposées que d'autres, ce sont celles qui sont dans un contact
plus immédiat lors de la copulation ou bien celles qui sont
couvertes d'une épiderme mince.

Chez l'homme les chancres attaquent ordinairement
la prépuce ensuite le gland & importent dans quelle partie.
astuce a dit qu'on ne voyait jamais de chancres à la
surface intérieure de la prépuce mais on en voit souvent à la
surface extérieure et souvent au gland. On en a vu
quelques fois de chancres verts se réunir & viennent sur la
coupe, mais cela est très-rare et alors ils sont compliqués
avec des pustules.

Chez les femmes les petites lèvres, la grande, la
fourchette l'entrée du vagin quelquefois la face

antérieure des grandes lèvres, quelquefois la surface externe et autres parties intérieures, ou antérieures, au pourtour de l'anus dans l'un et l'autre sexe, & souvent, à l'ongle qui se trouvent dans les angustrophites résistants — du repli de la peau à cette partie, entre chaque repli où la peau est plus tendue se trouve une matière sablée... on se appelle ces ulcères ragades, et ne sont plus plus difficiles à guérir que d'autres, mais quand elle sont à l'intérieur de l'anus elles sont plus difficiles à reconnaître et même à guérir — finir par le produit du contact immédiat; tant fois ce n'est pas le fruit de la débâcle anale se fait.

Le noubril en est quelquefois le siège, ordinairement ils sont confusifs, cependant quelquefois ils ne le sont pas comme par exemple si le mucus pénètre par le pénétrant sur le ventral pénétrant dans la cavité du noubril. C'est chez les personnes surtout chez lesquelles le noubril est enfoncé, alors l'épiderme en plus mince plus tendue et plus susceptible par conséquent d'être pénétré. ensuite la malpropreté qu'on ne peut tenir cette partie surtout après la cohabitation peut être cause. on en voit quelques exemples.

Les chancres ont lieu aux oreilles, tantôt dans la conque tantôt à l'entrée du conduit auditif tantôt dans le fond du conduit auditif externe. ils sont toujours confusifs, à venir de basins — des cists portés sur cet organe. mais l'épiderme en plus épais en ce endroit à cause du contact de l'air. ordinairement ils sont difficiles à guérir parcequ'ils sont compliqués avec d'autres maladies parceque d'ailleurs il y a alors perforation du cartilage &c. et dans le conduit auditif ils sont compliqués de carie du conduit auditif externe.

• Verru plaie, ... souvent le membrane.

internes des paupières, souvent le cartilage tarsal se trouvant
attaqué par la maladie et quelquefois les paupières sont
perdues quand la maladie a été négligée est ancienne et
dans ce cas les rayons lumineux valent plus modifiés sont
frappés le globe de l'œil et fatiguent beaucoup la vue.

Ceux qui ont bien sur la cornée transparente, ce qui
arrive après fréquemment sont encore plus funestes car
ce que la cicatrice donne de l'opacité à la cornée
transparente empêche la pénétration des rayons
lumineux.

L'ulcération de la membrane pituitaire est souvent
complication de la carie des os qui entrent dans la
composition des fosses nasales.

La bouche tend à s'élargir qu'on s'entend par là est
également la siège de chancres, et cela est fréquent surtout
chez les enfans qui sont atteints de varicelles, ou qui
en sont atteints & chez des personnes plus âgées qui
embrassent des enfans infectés chez les hommes qui
embrassent des femmes infectées et réciproquement et
alors c'est un symptôme primitif... d'autres sont consécutifs
et ceux là attaquent toutes les parties de la bouche... pour
la langue elle est souvent sillonnée perforée détruite
en grande partie par des chancres - un homme qui est
encore dans l'hôpital s'en est vu perdre une grande partie.

L'arrière bouche la membrane du pharynx & quelquefois
le larynx est porté si loin que les parties molles qui
couvrent la colonne vertébrale sont atteintes de même
que les os. quelquefois il y a communication des vaisseaux
avec les voies aériennes

Les chancres ont lieu fréquemment à l'origine
des ongles attaquent les doigts par de mains font de mal
à l'infection des ongles de manière que les ongles

Contact, le simple frottement trop long et continu peut produire des excoriations... et on voit des personnes, chez lesquelles il fallait un frottement de demi-heure pour appeler l'orgasme vénérien. Et les personnes frottant continuellement se font des excoriations.

un homme qui avait subi la castration pour une hernie congénitale était obligé de se retirer 3 quarts d'heure ou un heure pour des frottements continus pour le mettre en état de se tenir raisonnable, et il y avait excoriation. quelquefois des personnes ont le frottement d'un doigt que les femmes nomment combure. par un frottement naturel toujours continu de la filasse déchirée: il en résulte des ulcères qui ne guérissent point des ulcères vénériens. quelquefois aussi une introduction de l'homme et chez la femme dans laquelle la vagin est quelquefois déchiré dans les membranes hymenales dans la fosse interne des petites lèvres...

chez les enfants encore jeunes chez lesquels les parties ne sont pas assez développées, il y a des déchirements lors des pénétrations. pouvant occasionner une fèvre d'ulcère profond qui paraît peut-être comme une matière purulente = il y a gonflement ulcère purulente = l'écoulement par la partie, qu'on appellera l'écoulement de la maladie vénérienne... si l'on décide que la femme a la maladie vénérienne l'homme dira que ce ne peut pas être lui qui la reçoit puisqu'il a été vu qu'il a donné la maladie et cela dans ces cas difficiles et le tout est appelé communément qui peuvent lever tous les doutes ou d'écoulement ou de fèvre si elle a eu l'écoulement de la première manière quelle qu'elle soit avoir été vu, il peut à des reprises y

avec des excoriations et chaures au même temps, on
passera sur l'homme qui a coûté avec les femmes nos points
de figure, de chair, ven. &c.

quelquefois des malades se donnant des applications
de chaures sans des applications de substances irritantes
comme la cantharide, la sabine &c. dans les uns d'ailleurs
de fonges &c. pourait il se voir des malades qui pour aller
à l'hôpital montreraient de pareils ulcères, mais
ils n'auraient pas tenu sur les précautions de l'art
la pellicule qui avait été le résultat d'une
application.

on dit que les chaures en plusieurs espèces
Les chaures immédiats sont ceux qui viennent
dans les lieux où les contagieux ont été appliqués
les médiateurs, ceux qui sont pas touchés les parties
inférieures... ceux qui dépendent d'un corps médiateur
sont ceux qui se montrent sur des parties éloignées
d'ailleurs qui a pris d'infection.

La chancroise se développe du 4^e au 12^e 35^e
jours que la maladie commence à se faire sentir.
il se passe dans la machine un quelque chose qui
rend tout à coup les malades, on les qui leur
fait sentir une espèce de malaise. le jour
même de la maladie des symptômes se font
sentir. si est un chaure alors c'est une
espèce de chancroise dans l'endroit où
les chaures se perçurent. il se change ensuite en
d'aucun point. un grand de l'ordre des
d'ailleurs dans le point brillant. si on se
gratte il paraît une petite ulcération
alors paraît ensuite douloureux moite plaie...
mais si la maladie augmente c'estiment
paraît le caractère d'une douloureuse véritable
qui est plus ou moins considérable suivant
de la nature de chaure, son étendue &c.

17. Le pulcère est inflammatoire son accroissement se fait
soit au largeur soit au épaisseur... mais il est indolent il
se borne souvent à 2 ou 3 lignes. le 1^{er} peut naître que
cette étendue, mais les parties environnantes sont enflammées
s'il est rougeant il s'étend &.

quand pulcère est formé ses bords s'élèvent
un peu plus que dans les ulcères ordinaires, sa couleur est
grisâtre la suppuration est tenace & mais ceci n'est qu'une
description vague.

quelques jours après l'infection quand la maladie
s'est développée c'est un chancre... leur traitement peut
être considéré ou comme atténuant le principe de la
maladie ^{générale} ou ^{localement} en combattant le développe-
ment de pulcère de là deux traitements généraux ou
traitement local. Le 1^{er} ne peut agir sur le chancre que
par la ^{propagation} de la circulation générale tandis que le 2nd
est immédiatement appliqué sur les parties affectées.

Les médicaments anti-venéreux peuvent être pris
dans les 3 régnes..

L'alcali volatil qui a été représenté comme guérissant
parfaitement la maladie vénérienne a été plusieurs fois
employé sans succès.

Le mercure tel qu'il a été employé au commencement
de la maladie c.à.d. en frictions doit au commencement
d'un 9^e siècle pour les maladies cutanées. or, la maladie
vénérienne se présente avec des symptômes cutanés on
cruit devoir la traiter de la même manière et l'on
effectue les frictions mercurielles quoiqu'elles n'y paraissent
réussir. peu à peu on perfectionna l'onguent et l'on
en vint enfin au point de regarder comme inutile
tout ce qui n'était pas mercure, pour ainsi dire, c'est
qu'on ne s'aperçut que le mercure avec les quinquina. depuis
il y a l'onguent simple = l'onguent double quand on
met parties égales de dans ingrédients auquel on joint
du cerat blanc dans certaines circonstances. on
fait autre fois le frictions l'abord sur une jambe
sur l'autre sur des cuisses puis sur un bras et enfin sur

sur la tumeur... s'il en est reconnu qu'il suffise
qu'il y ait absorption en quelque lieu que ce soit
qu'il suffise par exemple de frotter les tumeurs
inferieures ainsi une jambe apres le bain puis —
d'autre jambe alternativement... il faut
commencer le traitement par une purgation...
autrefois on friccionait apres le bain... aujourd'hui
on le fait alternativement. Les frictions se —
donnent depuis 24 grains jusqu'à 50 ou 200 grammes
suivant la longueur l'ancienneté de la maladie et
le temperament... pour boisson on donne une
simple tisane de chicorée de delay aux fr —
on prescrit les viandes salées... les ragoûts, épices, &c.
on a dit mal à propos qu'il ne fallait pas
permettre l'usage de soupes crues... c'est mal à propos
il n'y a point d'un couramment dans l'usage de —
la salade et de fruits pourvu qu'ils soient
bien murs.

quand les glandes salivaires ne sont pas
sujettes à l'écoulement du mercure, on continue
jusqu'à la fin l'usage des frictions dans le —
cas contraire on les modifie... pour arrêter
les pus cept il y a de la maladie... pour arrêter
l'examen tous les jours les gencives du malade et
la bouche... si la maladie y fait de la chaleur
si elle est plus altérée, si les gencives sont douloureuses,
rouges gonflées &c il faut alors diminuer la —
quantité de mercure ou la supprimer totalement
et quelquefois même il faut combattre les —
accidents en employant ou les gargarismes
ou des bains de bouche... quelquefois
il faut appliquer des vesicatoires

19. en la cautère pour porter quelque autre part
l'irritation.

quelquefois le mercure donne le développement
des parties de long vers le haut... ou administre alors les
tisanes adoucissantes (comme bouillons de veau, dissolu-
de gomme arabique, préparations calmantes (comme
telle de perret, vin d'opium) Composé & le lavement
émollient, & des bains donneront un relâchement
général qui contribuera à dissiper l'irritation locale
des intestins.

quelquefois on fait usage d'une autre préparation
mercurielle donnée en friction, c'est le sublimé
avec le cerat. Les différents sels mercuriels conviennent
encore contre les maladies générales.

Celui dont on fait le plus grand usage est
en la muricate sur-exposée de mercure. La
dissolution s'administre dans une décoction quelconque.
quelquefois on se sert de muricate, on dissout qu'on
administre en pilule. La muricate se donne à
une demi-grain: dans les doses quelquefois on n'en
donne qu'un grain de grain à la fois, alors que le
quant de les doses. on donne la muricate dans une
décoction muilagineuse ou bien dans du lait
pour éviter qu'il ne porte l'irritation sur la
membrane interne de l'estomac. Tantôt dans une
décoction de graine de lin de quinquina & ordinairement
on le met dans une pinte de liquide qu'on garde
en 3 prises à savoir 3 le matin une autre à
midi & la dernière le soir... dans l'hospice on donne
la dose en entier dans un verre... d'autres fois on
est obligé de le donner en deux prises une le
matin, l'autre le soir. quelquefois on donne une
muilage rapproché à cause de l'irritation qu'on
craind, aussi chez les femmes grosses & de

de mercurie peut aussi être donné en pillule. Longtemps
on a craint qu'il ne créât du tartre sur les reins. Mais
on avait cherché à le modifier en le mêlant avec
avec des substances féculentes, ainsi avec la farine
de patate la plus amoniacale & mais donnée
seule il ne produit pas d'acide urique, ainsi
on le donne dans une petite ou il y a toujours un
12^e ou les 15^e parties d'un grain de mercure, il faut
après qu'il le pris. La pillule que le malade boive
on dissipe les doses dans une le pillule dont on prend
une le matin une autre dans la journée &c. une
autre le soir ou bien on en prend la moitié
le matin et l'autre moitié le soir. peuvent
être en fait usage dans l'hôpital sans qu'il en
résulte le moindre inconvénient. un malade
sur 50 ~~est~~ ne s'en pas plaindre. quelques-uns
de malades sont atteints d'irritations gastriques
au moment où ils boivent... il y a des personnes
d'ailleurs à qui le goût du mercure répugne
beaucoup.

Le mercure constant avec la graisse sert
donc pour les onctions, et la lubrification sur-oxi-
de mercure en liq. et en pillule est donnée
à l'intérieur... on l'administre dissous dans
de l'alcool ou de l'eau distillée et donne ainsi
une boisson illuminante... en pillule il
faut que le mercure soit très-divisé et
que chaque pillule contienne un gr. de grain
de mercure... à savoir 8.

une autre préparation est celle de
mercure doux ou poudre mercurielle
c'est une préparation mercurielle antiseptique
mais qui n'est pas aussi bien que
la mercuriale. aussi ne la donne-t-on
que dans les maladies récentes, ainsi dans
un écoulement rétrograde, ou hémorrhé-
moïde chez les malades qui ont des

21. chancres récents en pustales récentes & quand
l'indurité du chancre peut supporter la suppuration.
on en donne 3 4 jusqu'à 6 grains quelquefois 8
mais est rare. on la donne en pillules ou
poudre. on la mélange avec la gomme arabique.
en pillule ou l'incorpore avec une pâte
quelquefois pour la rendre purgative on
y joint de laubarbe. quelquefois on la rapproche
Mellament, qu'il y a des grains de ourgate. De mercurie
d'oy. de 100 inconvénient de se qu'on donne car
qu'il porte sur les intestins et 4 grains suffisent
pour produire chez certains personnes des coliques
d'après car il est bon de la mêler avec les
Rhubarbes, car alors ses effets irritants sont
beaucoup moins considérables quelquefois laubarbe
a été également utile. cette préparation
mercurielle porte Baillay aux quinqués.
une autre préparation est connue sous le
nom de pillules mercurielles qui ont été employées
dès le commencement de la maladie ou les
appellait pillules de barberousse à cause d'un
dit qu'il qui avait fait usage de per. elle
était composée de d'argente et de résine de
jalap avec le mercure. on y met
de la scamonee ou du jalap & c'est toujours un
purgatif drastique. Dans les premiers cas était
un purgatif il est au contraire dans le second &c.
c'est un anti-vénérien très-puissant que employé
très-puissant pour finir, il excite les salivations
venis fréquemment on l'administre moins
comme anti-vénérien que comme fondant
et comme auxiliaire de anti-vénérien ainsi
dans le cas d'engorgement quand les pillules
d'alors ne produisent rien, mais on a les mée

Donne, que quand les traitement a été complet
sans s'être avant il occasionnerait la phtisie.
Dose 48 grains a une once.

une autre préparation est le précipité
rouge ou blanc. Le plus grand nombre de auteurs
le font éléver contrain. Il produit des nausées & est
irritantous insupportable, aussi l'usage de
mercure rouge avec l'acide nitrique ne doit
jamais employer qu'à l'extérieur ou avec un
12^e de précipité dans l'onguent de la mercuriale
de basiliens qu'on applique sur les ulcères dans
les chancre, indolens, ... à plus forte raison sur
les ulcères fongueux & rouges il produit des
grands inconvénients.

Dans le règne végétal sont les sudorifiques -
exotiques et indigènes
parmi les indigènes sont le bardane la feuille
de persicaire le bois de guinée &c. en général
Racine, la substance aromatique ont les propriétés
antivariétielles à un faible degré. Il faut les donner
à forte dose et avec une substance qui de faibles
auxiliaires.

Parmi les exotiques les quinquina la passiflora
les quinaux sont-ils plus qu'aucune autre des
indigènes; mais la sassa-parilla et le guyaï sont
véritablement anti-variétiels.

Ces deux plantes sont des substances qui ont été administrées
15 ou 18 ans après l'apparition de la maladie. Ils
ont produit la guérison inférieure et la guérison
présent on les emploie ou avec des
antidécroissants ou avec des antiseptiques
villules. La sassa-parilla se fait avec la
sassa-parilla seule ou bien mélangée avec la

23. gypse... mais on a fait d'abord des t'hammes si légères
qu'elles ne produisaient rien on ne les faisait bouillir
qu'un quart d'heure ou bien on ne les faisait même
qu'une légèr infusion... on employe 2 onces de felle-poreille
et une de gypse ou une once de lime et de craie.
il fut un temps où la felle-poreille coûtait 1400 livres
d'onces tandis que le gypse n'en coûtait que 10 S. = quand
on fait usage de cette tisane elle produit une
bonne transpiration mais quand on en prend 4 ou
5 verres, mais il faut rester dedans ou autrement
on en donne le soir le matin et un autre
durant un autre la soir... cette préparation est
capable de détruire la maladie récurrente, mais
mélangée avec... aide à la guérison. elle convient
mieux =

on fait un sirop un rob pectorique dont
on donne 3-6-7 onces. sans d'abord de grandes masses
et de la propriété anti-récurrente et se fait ainsi que
l'administration des vers autres, on y joint dans le
temps d'autres substances pectorales, assésques et on ne
donne comme des substances aromatiques...

autre sirop... c'est celui de cistifera de felle-
poreille on fait la base, on y joint ce qu'on a de la
surrache de rufes de provins &c... qui ne servent de rien
ou le rendait purgatif... mais il se décomposait...
et il perdait la propriété anti-récurrente

on a mis de gypse la felle-poreille dans
du vin. mais les masses dit on au cird obtiennent de
bons effets. il paraît que cette préparation convient aux
affres aux personnes faibles soit à cause de la
maladie soit par celui des autres causes. dans les
autres années on trouve encore la felle-poreille
réduite en poudre et formant une opacite en y
joignant du genièvre et certainement alors
c'est une substance la plus énergique... on y trouve

De même la poudre d'alez d'a dans un liqide galeux,
il y a eu des ardeurs, palpures, presentes, comme au-
ventrisme, ainsi le trisisme du polidini ou il -
entre de son sale, paraitre masquée par le brou d'au-
tisme des trois-voies, au-dessus en italie et agitée en
France par le fil de polidini dans quelq et ait fait
fortune...

La Guine a moins de propriétés que la Sphérande
le passage est plutôt enclavé pour donner une fausse
agréable aux emplacements anti-vieillesse qui lui conviendrait.

Le traitement local qui convient aux chancres
quelquefois il faut un traitement général contre les
chancres. Considérés indépendamment des maladies
secondaires.
pour les chancres indurés au gland, au prépuce, et
autres aux environs; à la foretchette aux fèvres, chez
les femmes, il ne faut pas employer il ne faut pas
employer un traitement local; le traitement
intérieur suffit. ainsi quand le chancre est bien
accrû le pansement mercuriel suffit. autrement
Mercuriel.

Chamere, veniens. charpie ou linge trempé dans une decoction... ou bien on emploie à cet usage une autre decoction... le guérissent dans 15-20 jours, mais souvent il y a complication ou bien on n'est pas dégoûté, le corps se réchauffe.

appelé tout quand ils sont stat ionnaires il faut combattre cet état d'indolence, quand ils sont sans douleur on peut les stimuler d'abord par une effluvia de marisoles par seigues de potasse (cr.) ou de vin de quinquina composé de phos. de quinquina. Longueurs brues ou bien balaïticum dans lequel entre de un 10^e ou 12^e d'oxide de mercure non acide. utrique ou precipité rouge.

quand malgre ^{les efforts} de ces moyens il n'y a pas d'irritation ^{et}
 aux parties environnantes ne se font des pustules de cuir. La
 infection d'argent fondue est quelquefois nécessaire, et alors
 on amène les chancres à la cicatrisation d'une manière
 rapide... Cependant il y a de qui résistent encore. Il
 se forme à leur surface des pellicules callos, glauques, qui
 est alors il y a une vive irritation une humeur acrimonieuse
 qui les entretient, alors examinez s'il n'y a point de
 tubercule dans les os vois... et même dans les os
 contraire il est quelquefois utile de passer de profond
 une saignée ou mouvement général qui change
 de mode de direction et après ~~quelques~~ celui on
 trouve un nouvel aspect dans le plaie.

Si tous ces moyens sont vains il faut tourmenter le
 plus énergiquement et ulcères indolents, ainsi incurables
 d'autrui même on brève d'autrui même... Les ulcères
 qui ont résisté deux mois de tous les moyens ont
 guéri par deux applications de cette substance
 quelquefois il faut désorganiser plus promptement
 alors c'est être potentiel qui amène une guérison rapide

Mais quelquefois ces chancres qui étaient
 indolents stationnaires, deviennent inflammatoires,
 toutes les parties environnantes deviennent rouges... d'infla-
 mation par eux-mêmes par les moyens stimulants employés
 il faut le combattre

quelquefois il y a douleur aux chancres, par
 beaucoup d'inflammation aux parties environnantes
 il faut alors le traiter comme chancre malin, douleur
 = encollier &c...

il y a des chancres qu'on appelle mobiles
 qui se cicatrisent d'un côté tandis qu'ils s'ouvrent
 de l'autre... un ulcère a fait tout le tour du
 plaie, malgré les antiseptiques &c il se cicatrise
 plusieurs fois il se même brule... car ce
 seul moyen qui paraît avoir réussi, le malade
 étant parti d'ulcère guéri dans les 3 quarts de son
 étendue.

27. urines en portaient... dans ce cas il faudrait circonscrire le
terme.

Mais, comme de ces douleurs, nées d'aucun ^{autre} principe que d'une irritation
peut les arrêter il n'en est pas de même de douleurs inflamm-
matoires, et de douleurs, douloureuses très-différentes des précédentes.
Il peut y avoir des douleurs douloureuses sans inflammation
presque ou de douleurs douloureuses qui ne sont pas inflamm-
matoires, jusqu'à un certain point; car, malgré qu'il y ait
un air point d'inflammation sans douleur et de douleur sans
inflammation, quelquefois on peut régénérer dans tout
le cas de douleurs et dans les douleurs d'inflammation
comme accessoires.

Il y a des douleurs inflammatoires. L'inflammation
est locale autour de l'ulcère, quand les parties sont saines
à l'extérieur quand il n'y a point de fermentation par les art-
ères le sang par le prépuce et alors la maladie n'est
pas prise par l'accroissement.

Inflammation exiguë ou à l'air qu'on le -
prépuce forme phymosis ou paraphimosis.

Le traitement dans les cas est facile. D'abord -
quand les parties avoisinantes sont seulement enflammées
on prend des bains généraux des préparations adoucissantes
de l'urine relâchant les bains locaux de l'urine au long
de la verge de l'eau tiède qui est suffisante. Quand
on voit quand elle est malade avec la substance -
molle. Il est rare que par l'inflammation ne
dède pas à ces moyens et alors on peut employer
les anti-vénéreux au commencement pour le genre
de la dose, et au cas de l'urine de dose est telle que
quand l'inflammation est dissipée. On applique aussi
dans le cas les champignons ou de l'eau phagédénique
et les préparations avec l'opium.

Quand l'inflammation est suppurée de tout
le membre on ne peut faire l'application que sur
toutes les parties et comme il y a suffisamment de
circulation ne peut se faire et souvent les ganglions
sont enflammés... alors il faut employer les moyens
indiqués dans l'inflammation, à d. tirer

28.

Du sang dans une partie éloignée comme au bras & aux jambes, on s'est employé, pour dégorgers les parties, il y a inflammation sans construction sans resserrement sans douleur sur le gland les saignes venant à être utiles dans le cas contraire les douleurs produites rendent la maladie plus grave on y appelle le gonorrhée.

Quand dans l'inflammation générale le prépuce se couvre le gland et qu'il y a phymosis, on tire les moyens pour il a été prouvé il faut de demi en demi heures faire des injections qui sont dans ce cas un des moyens les plus efficaces.

Quand elle est la suite d'un resserrement du prépuce derrière le gland alors que les topiques qu'on emploie le resserrement le traquent, on se préoccupe de brider la circulation, il faut brider toutes les parties qui sont resserées, et pourvu que le principe vital n'est pas étouffé dans la partie le gonflement se bridera et on établit la circulation.

On parvient avec l'inflammation dans certains cas, l'inflammation marche très-rapidement et la partie est frappée de gangrène, mais la douleur n'est pas faite avec l'immobilité il en résulte une ulcère béni qui se cicatrise avec rapidité, mais il y a destruction de la prépuce en partie d'une partie de gland surtout quand l'inflammation est étendue à tout le gland dans cet organe.

On a vu le quart le moitié le 3 quarts et la totalité même de la verge frappée de mort. Un malade avait un ulcère au verget qui lui avait toute mangée, il venait de l'hôpital ce qui n'est pas empêché de communiquer avec une femme il est vrai que la peau se séparait de la verge.

29.

un autre n'en avait que la moitié la peau lui couvrait
de gland et de prépuce.

~~quelques~~ que l'inflammation s'est terminée par suppuration
ou par gangrène il n'en résulte qu'un ulcère béant.

chancres, douleurs, rougeurs malins

ils se présentent accompagnés d'une vive douleur qui est
lancinante. ^{l'irritation} leur surface est inégale et leur surface est
couverte d'une suppuration tantôt tendue tirant sur
le gris tantôt tirant sur la couleur d'un vin. La douleur
est aigüe mais seulement dans quelques lignes
et le reste du membre est souvent très-sain.

quand une maladie de ce genre se présente
si on la traite par la méthode vénérienne ou laignée
il faut donc employer contre elle, tout ce qui est
adoucissant, les bains locaux et généraux & uiser
comme il y a beaucoup d'avis à cet égard, d'acides, de préparations
nervineuses. Il faut recourir aux narcotiques. on donne
à l'intérieur dans une boisson adoucie, quelque
gramme d'extract de gomme d'opium ou 10 à 15 gouttes
de vin d'opium composé d'eau de menthe ou
d'extract de tête de pavots mêlés avec du lait
de racine de graine de guimauve & peu d'essence
général. la chancres n'est pas curable en très-intens
cela suffit. Dans les cas continuels, il faut recourir
à de l'extract de gomme d'opium en grande quantité
et de même pour les toziques ~~ou~~ souvent on
emploie sans insuffisant. il ne faut pas en discontenir
ni pour ces usages, afin que la maladie
n'augmente pas.

cependant si la maladie se diminue pas ou
quelques augmentent il faut examiner les voies & si
mais les chancres, par un traitement irritant
soit général soit local détruisent les parties
ou les font dégénérer en cancrs

un malade avait sur le prépuce un
ulcère béant pour s'étendre mais s'arrêta

douloureux et sans discontinuation... ou les traites avec
des frictions mercurielles... ou cicatrises la chancres... cependant
il fait des progrès; on perdit les frictions à 40 grains de mercure
et déjà le chancre qui n'était de bord que 3 lignes d'un côté
était comme une pièce de 24 S. une autre médaille y
fut appliquée l'onguent brun et admettant ^{par} un
nouveau traitement, nouveaux progrès... une autre médaille
fut cicatrisede avec la même nitrogale; il était alors
comme une pièce de 3 livres... le malade vint à
l'hôpital. les bords de l'ulcère étaient renversés, la
surface pannée douloureuse; il y avait un engorgement
très considérable aux bords, un tumeur aux aines, groin
avait regardé comme redoublée et sur laquelle
on avait fait des frictions. il vivait en bonte
d'un ^{pus} ~~pus~~.

Dans d'autres circonstances l'amputation de
la verge est la seule ressource et si on temporise
le corps de la verge s'engorge et le mal gagne les
racines de la verge et alors l'opération est très
difficile. cependant il l'a faite avec succès... mais
après l'opération quand on coupe d'un côté il se
reparaît un autre; ordinairement quand le
présupposé cancéreux a été extirpé
cependant il faut remède à l'opération
parce qu'en tous le principe cancéreux ne
s'opulente pas. 10 à 12 fois il a fait l'opération
quand le malade n'était pas encore trop développé
sur le malade la maladie se repare. il en est
qui par des excès nouveaux ont fait les can-
cres que quelquefois la cicatrises se déchire.
un homme de lettres pour avoir fréquenté
des mauvais lieux eut un petit chancre sur
le prépuce il s'adressa à la mère abbaye qui
lui procura un chirurgien. cet homme lui

31.

appliqués sur l'ulcère de longant brun qui n'existait
 toujours quand le chancre est devenu mais jamais
 quand il est inflammé, comme il n'y avait jamais
 point d'amélioration de la maladie, pas de suppuration
 Cancer au nez. le chancre se jeta vers les
 cornues du gland, dans le tissu cellulaire du
 corps caverneux. quand M^r Cell. fut appelé
 les bords de l'ulcère étaient renversés, superficiels
 douloureux & il employa les calvaires, les narcotiques
 mais déjà l'irritation était dans tout l'organe
 la maladie a fait des progrès. le prêtre a été
 tellement dégoûté que le danger a passé par
 la honte de la peau. il croit qu'il succombera à
 la maladie dans quelques mois. le cancer s'est
 porté sur les bords, dans le tissu cellulaire du pénis.

Le danger de viritans est encore plus grand
 chez les personnes d'un certain âge, sur ceux
 qui sont fortement constitués, sur ceux qui sont
 d'un tempérament nerveux, sur ceux qui ont
 déjà eu des maladies du même genre de bubons
 &c. on doit donc ménager ces chancres, comme
 comme la maladie la plus dangereuse. car
 la pratique qui l'ont de combattre est
 ordinairement mortelle dans tous ces cas.

il ya des chancres inflammatoires chez
 les femmes. ils sont accompagnés d'un grand
 développement de grands ou petits lèvres
 quelquefois l'inflammation est si rapide que
 la gangrène (comme cela arrive) se le présente
 peut se développer. l'inflammation demande
 le même traitement que chez l'homme. si
 la femme est pléthorique ou la saignée &c.

il ya de même pour les des chancres
 malins ou gangreneux. et même mêmes accidents
 il en des maladies qui ont des ulcères qui détruisent
 les parties intérieures jus qu'à ce qu'ils soient

32. fait par suite de la suppuration ^{des ulc.} fait par elle de ces
grandes irritations.

une comédienne avait eu quelques changements de
ses plus grandes inflammations aux lèvres, les lèvres de
centrifugées avec le marteau sans inconvénient sur elle, et lui
administrer au même temps un traitement interne.
Les petites lèvres furent gangrénées il y eut perte de
substance. Il eut quelquefois une nouvelle éruption
de la maladie en sorte que lorsque l'ulcère fut sur le
point de se cicatriser il le cautérisa encore au point que
la douleur se développait avec des degrés tel que les
malades ne pouvaient plus supporter le traitement, et
à cette époque les ulcères appelés les surfaces de l'ulcère
présentait deux puits, de diamètre quand on aurait
les lèvres, il avait dégénéré en ulcère cancéreux. Un
de ces moyens adouçants possibles, baies de fige &c.
dans quelques circonstances, il faut se contenter d'un
bain local ainsi quand le sujet est affaibli = il donna
des baillons adoucissants, mais des decoctions de -
grains de lin de fêta de pavot et des mercurielles sur
la partie. 3 grains 3 grains d'opium par jour
avec l'extractif de ciguë. Sans fruit pendant de temps
il y eut une légère amélioration et sans un
mois l'ulcère eut un aspect cancéreux. Il fut guéri
dans l'espace de 3 mois. Il n'y avait pas de disposition
cancéreuse chez le sujet mais quand le moyen
irritants ont été discontinués la partie affectée
a été guérie. . . très-probablement le principe
recrudescence n'existait plus. plus qu'il n'y a pas
donné à cette femme. De remède interne. . .
précaution un traitement de précaution de l'ulcère
rien cependant quand le malade fut
trouvé en bon état.

Il y a des ulcères qui se font dans le
malin sont rouges. Il y en a d'autres
le siffle et l'ulcère du crâne. Les ulcères de l'ulcère
de l'ulcère l'ulcère, quelquefois il y a une pénétration
dans le rectum, l'ulcère il y a une pénétration

33. antérieure du rectum est celle que les vésicules fécales un
portent davantage par le vagin que par le rectum.
et les ulcères, rougeurs du rectum dans le vagin sont
encore assez communs.

D'autres chancres sont stationnaires, dans lesquels
quelque traitement qu'on administre, est étalé et
s'élève très difficilement à changer parce que les femmes
sont les moins pures dans l'hôpital qu'elles vont courir.
elles les purgent, traitent de leur côté les autres, sont abusives
de la nature abondante qui vient de la matrice... une
douleur prend de l'accroissement sans être douloureuse
et quand il est organisé cela il est difficile qu'il
guérisse. cependant il aurait guéri, au commencement quel
avec assez de facilité.

Chez d'autres femmes une irritation locale les
y entraîne. parce que leur imagination effrénée
y appelle les yeux une révérence... et les titillations les
irritations, réactions, auxquelles des follicules
font que ces ulcères résistent non seulement au
traitement général mais encore au traitement local.
ou en soit la masturbation... cette des chancres, qui se
trouvent sous le clitoris... dans l'irritation opérée
sur la surface par l'ulcère et ensuite irritation par
la main et puis l'existence de la maladie vénérienne
sont trois sources des causes de cet état stationnaire
quelque fois aussi le défaut de traitement en est la
cause - chez quelques-unes, de ces femmes la partie
est indolente, d'autres fois, elle est enorgueillie.

Les chancres ont bien aussi un porteur de larmes
ils se remuent spécialement dans les filloirs résultant
du frottement de la peau du bonnet qui étant allongé
s'ouvre cette femme aux alèzes, ils sont quelquefois en un
petit nombre, quelquefois ils sont en un grand
tantôt qu'ils s'absorbent autour de l'anus.
dans d'autres cas ils occupent encore la partie
résultant du frottement, c. à d., occupent tout
de la partie ou bien ils sont gagnés localement
chez ceux qui jouent le rôle de Janin.

mais souvent ils ont l'air d'être guéris localement, —
quoiqu'ils le soient par les voies générales. Sans doute —
comme cette surface présente une peau tendre qui est —
humectée par la mucoïté par la nature des glandes, —
si elle est facilement infectée et quand —
la maladie est guérie par les bords elle se porte —
ordinairement à l'intérieur — ainsi enfors qui tétent —
nourries = &c.

Les chançons se font guérir indolent ne —
demandent que des soins de propreté. cependant si —
restent dans les téguments, il faudrait les bruler —
quand ils sont inflammatoires, ils présentent des —
accidents tels que quelquefois il se développe une éry-
sème dans le caput de l'anus, qui est difficile à gué-
rir. La felle... 4 à 5 fois de ce virus la gangrène se —
manifeste, avec d'autres moyens curatifs que ceux indiqués —
ulcères, devenus cancéreux id = —
Les écarts ont quelquefois lieu jusqu'à l'entrée —
de l'anus, alors ils ont été plus particulièrement —
le caput de l'anus se prête difficilement à l'introduction —
d'un corps galvanique... quelquefois, il est vu les —
nerfs, flexibles, surtout quelquefois assez gros que —
le membre viril mais la dilatation se fait peu —
après les parties se prêtent à cette dilatation par —
leurs modes d'organisation, etc. elle se fait de —
dedans en dehors... au contraire, il y a —
stimulation sur la surface de l'anus, sous la —
copulation, contra-nature et de sphincter —
se rapporte bien loin des parties dilatées, aussi souvent —
à l'effet des déchirures, à cette partie surtout —
quand l'introduction a été brusquée et que —
elle est dans le cas surtout que les —
trouvés des ulcères, vénériens internes, etc. —
sont plus dangereux que les externes parce —
qu'ils ne se guérissent pas jusqu'à quel point

L'ulcération de la porte parait que la muqueuse du rectum s'ulcère ainsi que les membranes fécales, quand les selles dures sont repoussées... alors il y a excitation irritative sur les mêmes surfaces ensuite une grande difficulté de appliquer des médicaments de la sorte... à chaque instant il faut y pousser des injections. il faut y appliquer de la charpie quand il en est possible, imprégnée d'un médicament adoucissant.

car on exaspère l'irritation par des excitans et même on risque de déchirer les parties... mais quand le traitement est administré d'une manière convenable, souvent des injections suffisent... si c'est pas rationnel le chancre peut devenir cancéreux, des tubercules peuvent se développer et alors la maladie est très difficile à guérir si elle n'est pas incurable. quelquefois la paroi antérieure du rectum et le tissu cellulaire qui se trouve entre cet intestin et les muscles se trouvent percés dans l'homme... chez la femme la communication se fait du rectum dans le vagin... les matières fécales y passent et c'est une maladie d'autant plus dangereuse qu'on n'en a vuement il n'y a pas moyen de la guérir...

plusieurs femmes en meurent à cause de l'écoulement colligatif qui ont continué à déterminer ces infirmités, et par les chagrins qu'elles courent en voyant ~~passer ces choses~~ ^{de} s'éteindre de fond en comble, les délices de leurs respices et l'absence de leur indépendance. chez tout le monde dans le desespoir.

Les moyens qu'on peut leur opposer sont les injections des lotions avec les préparations d'acide carbonique quelquefois les machines mercurielles qui ont l'avantage de porter le médicament sur la maladie mais c'est quand elle n'est pas ancienne et qu'elle n'est pas encore bien étendue et alors...

si on s'affaire à une Malade raisonnable il est bien plus facile de le guérir que celle qui entre dans des hôpitaux = aussi une Malade qui avant une longue ére dans les rectums en est il guéri au bout de 4 mois... très - souvent les Malades qu'on traitait par les frictions chirurgicales étaient soigneusement appliqués. Et quand les Malades sont rebelles, c'est au guérir ont été traités avec un peu de bien que le Malade n'est pas été approuvé.

Les communications établies entre le rectum et le vagin sont beaucoup plus rares que celles qui ont lieu entre le rectum et le vagin. Il en a eu quelques exemples. on manque de moyens pour les combattre. cependant il faut combattre les Malades y remédier. cependant il faut des moyens nécessaires, on en a proposé plusieurs. le seul convenable serait des frictions au passage des matières fécales, et si on y parvenait la guérison serait certaine... on a proposé l'usage d'un petit anneau de métal, porté très-haut. quand elles sont en place les parties tendent à se rapprocher... mais il faut aller à la pelle... on veut bien sans doute diminuer l'ouverture (Voy. ceux chirurg. de Bell...) de Malade dont il parle vient à l'hôpital des chirurgiens avec un élève de la même étendue qui s'opposent, et y mourant avec cette communication du rectum avec le vagin.

on a proposé l'introduction des canules de gomme élastique, mais on les a fait à l'usage et forme d'entonnoir (et c'est la la manière de les faire, avant qu'on ne les introduit) comment faire l'introduction l'un ne pourra entrer un long que dans l'anus

et demi de diamètre et quand bien même il —
 permettrait l'entrée d'un plus volumineux il ne pourrait
 remplir tout à fait la cavité de l'intestin rectum
 si est cylindrique on pourra le introduire avec
 facilité mais il y aura plus d'inconveniens encore

quand des matières fécales commencent à
 passer par le vagin il n'y a que le ~~vagisme~~ de propriéte
 qui puisse empêcher le progrès de l'ulcère et une
 inflammation par le passage de matières fécales. L'ex-
 posé de prendre une position horizontale quand on va
 à l'angarde l'abaisse

Les chancres attaquent quelquefois l'ombilic
 il y a des individus sur lesquels il fait saillie. chez
 ceux là il n'est pas encore si douloureux, mais il —
 en est qui y ont eu enfoncement. alors le ~~liquide~~
 y est plus mince et il y a puitement d'un
 ulcère blanda sans la surface de cette cavité
 une pénétration véritable qui s'étendrait
 localement au point de développement de l'intérieur
 à l'extérieur pour y produire des ulcères...

Les chancres primitifs peuvent avoir lieu
 à l'exemple d'un homme généralement affecté
 de virus vénérien, a communiqué avec une femme
 et qu'il aille s'asseoir contre l'ombilic de cette
 femme: il y a vu des exemples il y en a encore
 un dans une femme à l'hôpital Malade. il en
 a vu qui paraissent rompus tout ils avaient
 fait des progrès, ils avaient une paille de profondeur
 les plus ordinairement ils sont superficiels.

Les moyens de propriéte ~~sont~~ sont grands et
 sont superficiels. le chancre est benign si y a inflam-
 mation adhésive calmée. il y a certaines au
 dehors la suppuration parce que la maladie est entretenue

bustes vides. ordinairement cela a lieu avec
la terminaison du traitement de la maladie.

que quelques jours après la destruction des parties
attaquées et qui paraissent nécessairement détruites
à la longue pour la suite de la maladie il est utile de
les supporter. quand les ulcères ont pénétré dans le
coudut and it y intome puis attaquer les os, les moyens
de propriété des injections avec le traitement général
paraissent quérir. dans le cas contraire quelquefois
la carie peut faire des progrès et pour que les
parties nécrosées se détachent il faut du temps. il faut
empêcher que le matière qui occupe les jours ne se
injection de toute espèce pénétrant les os.

il a vu toutes les parties du coudut d'os
attaqué et une exposition générale avec des
sur une maladie il os allus and an anastomose —
l'exposition ait été complète malade que
de traitement est été fait. heureusement
quelques fois les os se sont bts sans comme il
est en état d'usage.

puissent à la suite de pareils ulcères on
éprouve des brulures des aggraves qui existent
encore après la guérison de la maladie parce que l'air
est plus moelleux. ainsi c'est souvent les signes
sans symptômes. ou plutôt c'est l'absence de la
maladie et de son symptôme... dans des cas
de destruction des os appliqués des corps étrangers
qui avaient et les forme et la couleur de
la toile.

Exp 7
Quel tantôt ce sont les poignées, tantôt les autres
parties de l'os qui sont affectées, d'ailleurs qui
y sont presque toujours consécutifs. quand ils
sont dans le traitement général suffit
on peut cependant employer les collyres adoucissants
qui entre qu'ils adoucissent les parties les touchées.

quand les paupières en sont atteintes l'ignom de ces lés-
 aussi et il tombe, quelquefois ils atteignent même les cartilages
 tarpe y'nt carieux... et ces ulcères guérissent avec des sangsues
 de l'entre (il y a inflammation & est fort rougeurs en
 vices, & même tantement que c'est de sang.

Ces qui sur la cornée & sous parents se trouvent à la
 circonférence s'ils se trouvent au passage de rayons lumineux
 sur des points dangereux. s'ils sont plus profondément
 sur les plus d'ignom, ordinairement, les ulcères, peuvent être
 guérir mais il reste de la suite par leur cicatrisation.

Quelques fois quand le point d'irritation point par la
 canal de l'heretisme nous donne il en résulte une ophtalmie
 mais le phlogose de l'œil n'est bon pas là il se forme
 de petits points d'ulcération sur la cornée

un étudier en médecine antique ophtalmie fait
 dans quelques ophtalmes. Les yeux se terminent par
 résolution, mais le cornée sous parents ulcères, plusieurs
 cicatrices, y en ont bien. par contre est il n'y a eu que
 dans cicatrices, mais pour voir il est bête de
 regarder de côté et il n'y voit presque pas des yeux
 la cicatrice empêche au effet de passage des rayons
 lumineux.

Quand ces ulcères ont été négligés ont été
 pour ainsi dire la coque de l'œil il se forme des ulcères
 profonds & est. des malades ont par là perdu promptement
 des yeux. L'œil s'est vu & vu par la négligence
 mais encore plus par les moyens irritants employés
 par les charlatans. que le passage de la cornée
 transparente seulement s'il est attaqué et que les
 malades passent des progrès l'œil est alors pour
 la maladie perdant vue.

Chaque, d'un nez

ils peuvent bloquer les yeux d'un nez ou le bord
 intérieur de la cloison. ils attaquent aussi.

Les arriérés des 1/2^e navales ~~les arriérés~~ les parties dures
des cornes & comme des parties molles.

Les externes qui sortent bien dans la saignée des
Laites d'un à six réunies de la lèvre avec
L'air du nez, ils sont presque toujours couverts et appendus
ils guérissent facilement, si on s'y prend de bonne heure
pour les traiter. mais il se forme souvent des ulcères, et
ces parties, sans qu'il y ait de venérie, il s'y a que le
traitement qui puisse lever les tumeurs à cet égard, ainsi
quand par des adoucessements de l'ulcère, ils parviennent de
l'accroissement. C'est une preuve qu'ils sont vénériens.

Quand ils sont sur le cloison il y a de grandes diffi-
cultés à surmonter pour le guérir d'infection de la maladie
causée par l'indolence, qui lui ont présentée les ulcères, se
croissant dans un état de maladie vénérienne effroyable de
ce que leur avaient dit des charlatans et même des gens
de bien très instruits. de nombreux maigres, qui
revinrent les cloisons en état plus exposé à l'ulcère et même
continuel de sang, parce qu'ils ne peuvent y passer,
et de la excitation et puis ulcère de venérie que
la maladie fait de progrès... de la une maladie sans
avoir eu de maladie vénérienne à passer & à 4 fois
par le traitement vénérien.

un homme avait une semblable ulcère indolent
quoiqu'il ait été guéri d'une maladie vénérienne
on lui fit passer un charbon vénérien on lui fit
subir un second traitement long et prolongé, il
ne guérit pas, il vint à Paris, on le tourmenta
encore par un nouveau traitement... le pauvre
homme nous conta de toutes les sottises qu'on
lui avait fait avaler fut le même d'une
15^e de bon air de l'apothicaire dont il fut guéri...
enfin lorsqu'il se fut achevé il vint trouver
Cullerius, les cloisons étaient tellement
désolées qu'un petit file ne pouvait être
introduit d'un côté, tandis que de l'autre

La cavité étant très considérable. cet homme fut très
surpris de porter le doigt dans le nez. Il lui mit une excrois-
sance sur la base, remplacée ensuite par une entaille et dans
quelques jours l'ulcère se guérit. Il y avait une tumeur
dans l'ulcère enorgie qui ressemblait à un développement
d'un kyste. Vaut-il y a des cicatrices de conformation d'un
Lactaire et il faut bien se garder de se précipiter
pour un effet du vice vénérien comme cela m'arriva
que trop souvent.

Sur des Membranes d'origine on fait des ulcères, une fois
développés sont des progrès très-rapides à cause que
la membrane présente un tissu lâche. par conséquent quand
on reconnaît la maladie elle est avancée. par conséquent
on peut y appliquer des topiques. il se forme
cavités nécrosées aux os sous-jacents et surtout à ceux
qui sont proches de leurs surfaces, peu épais. ainsi
tous les cornes les moyens et les inférieurs surtout
quand on a reconnu la maladie offre tout pour qu'elle
soit guérie. Les membranes de traitement vénérien
laissent à croire que les membranes de traitement
la guérissent facilement. seulement il ne faut pas
s'arracher les pustules qui se forment; il faut
toujours tenir soigné en quelque sorte le malade
la suppuration et pour cela, malade qu'on ne
peut pas appliquer des topiques sur la partie, on
peut lui faire dans le nez des injections d'huile
et la pousser vers l'arrière os l'os douloureux, et les
croûtes endurcies font reconnaître la place de la
maladie. on peut encore y faire passer des
gâteaux de dent chaude qui se détacheront aux
croûtes endurcies, et les attendront et feront tomber
au contraire quand on arrache les croûtes
avec violence l'ulcère se guérit plus vite. Les progrès
des ulcères, des fongus vasculaires se guérissent de

La même Manière que ceux des autres parties, mais quoiqu'il
avec plus de lenteur parce qu'on ne peut y appliquer des
topiques, des médicaments &c.

Il n'y a pas de plus promptes et efficaces pour parvenir et les
maux, même si l'on n'est pas en état de les guérir
parce qu'il n'y a que l'air qui des y porte, et l'empereur
de l'air, les conduisent vers et se font en can-
cra il pour l'autre plus de l'air, qu'on ne peut jamais faire
si la maladie avance, on en voit si la membrane se
détache &c. cependant si la corne est au-dessus des
pauvres pour on odore et même de l'agréable presque
les apparentes, n'auront de grand la membrane seule
est attaquée la gangrène ne se donne pas une
si mauvaise... on voit que l'écoulement a lieu quand on
a des cornes que les maladies se attachent et alors les
fontes, dans ce cas le traitement doit être long
continu, c'est la conséquence d'une maladie qui a
longtemps duré dans les os, pour quelle fut
l'écoulement et se continuait par des symptômes.

quand la séparation des parties mortes de
l'os d'une partie est faite et la paroi complète, la
maladie qui restait se répare et même avec
les apparences de la maladie existante, on voit des
malades, qui ont eu des récidives et qui sont traités
jusqu'à 3 fois & très souvent après, de la même manière
bien méthodique, très souvent il se répare la maladie
et avec de l'écoulement plus grande, qu'avant, on voit
donc que c'est la maladie la plus difficile à guérir, que
celle où les symptômes, de la guérison ne peuvent
s'apparences pas eux-mêmes, ainsi il est bon de
continuer le traitement au-delà des doses ordinaires
avec et de le porter quelquefois jusqu'à 100 doses
de mercuriel, et même il est bon de combiner

Les piodorifiques, avec le mercure

quand les os attaqués font à la porte de la vie ou du toucher alors pour en prévenir plus promptement la guérison on cherche à enlever les parties qui vaillent à empêcher l'extraction, ainsi quand les cornues sont attaquées et qu'il se présente à l'aventure &c.

quand la carie attaque les os propres, comme la voute du nez il faut examiner si y a separation des os d'avec le vis et enlever le os et préserver par la même ouverture qui deviendrait nécessaire si la partie molle se cicatrisait.

après qu'on s'est été enquis de la nature des cicatrices tant qu'il est possible pour les commuer par la frappe. Continuellement les parties, alors il y a fistule aérienne ou quelque sorte. C'est dans ces sortes de cas qu'on cherche à boucher les ouvertures... quoiqu'ordinairement les fistules soit inévitable, après de semblable, curies, un malade a eu une infection aux fosses nasales, la lèvre s'est enflée du côté inférieur de os d'ulcères s'en sont déchargés. On y avait mis une manœuvre de taffetas gommé et gommé. Comme les bords de la plaie se touchaient, pres qu'il y eut le passage de l'air était intercepté. Les Cicatrices se font tout au fait après mais quand l'ouverture a une certaine étendue il faut recourir à la cicatrisation.

quelque fois après la destruction des parties, soit par les parties molles les cicatrices, mais il en résulte une déformation très-désagréable... on applique dans ces cas des nez artificiels qu'on recouvre au plus au moyen d'un tige qui va s'attacher à l'os et se perd dans les cheveux.

ulcères de la bouche

Les ulcères au fond de la gorge fréquent. Ils sont souvent primitifs, ainsi chez les enfans qui tétent ou

qui embrassent. Des personnes atteintes d'infirmité vénérienne, chez les personnes qui donnent des baisers lascifs à des personnes, gâtés; chez ceux qui portent le penis sur la bouche.

Il est bien des circonstances où les lèvres, venant à être ulcérées, sans qu'il y ait vérole... il y a bien quelques probabilités propres à éclaircir sur la nature de la maladie; mais il n'y a point de certitude à être positif... si l'ulcération dépend du virus d'une humeur acri-morueuse &c... on en sera assuré dans la 1^{re} cas par le sang qui produirait des cotons adhésifs, dans le 2^e cas on combattre la maladie par des délayeurs, des purgatifs et on obtiendra la cicatrisation; et si le sujet a été d'autre &c l'ulcère perdura & nuira son mauvais aspect.

un jeune homme avait une ulcération sur les lèvres supérieures avec développement de tissu cellulaire dans l'étendue de 6 à 7 lignes... Cull. lui conseilla l'usage de boisson adoucissante, délayante... la saignée qui présentait l'ulcère; la ressemblance qu'il avoit avec une ulcération cancéreuse lui avoit fait donner ce conseil. il lui prescrivit la nouvelle et le jeune homme fut très-à l'aise &c. le jeune homme fut adressé à une autre personne et lui fit prendre la liqueur de Van-Svieten qui le guérit très-bien. il a avoué depuis qu'il avait embrassé une femme publique très-pleine de sa passion dans les rues de Paris mais qu'il en était resté là.

une provinciale vint à Paris pour consulter les gens de l'art sur un bouton ulcéré, la lèvre inférieure était très-développée. Cull. la regarda comme une maladie cancéreuse. les médecins cancéreux qu'il regarda comme tel lui-même... cependant il lui fit quelques questions auxquelles cette bonne femme répondit toujours par une négative. elle n'avait pas vu de

D'homme on n'avait même pas fait de tentet un peu -
 n'importe &c. Cependant la question qu'il lui avait été
 faite, la trouvant dans la nuit elle se trouvait qu'elle
 qui avait été logée dans la maison lui avait donné en fait
 de pendant un baiser à la bouche et qui cependant avait
 été si bas que la langue l'écoula de cet homme lui
 était entrée dans la bouche... elle fit donc le lendemain
 cat avec qui avait de prétexte pour lui lui demanda
 de permettre qu'elle fit sur elle quelques investigations uté-
 rines... il trouva des pustules dans le vagin appa-
 rément pour ne pas permettre l'introduction du petit -
 doigt. la membrane hymen existait. la liguette des
 reins vint lui fut admistrée avec le pistoris que
 dans 15 jours le bouton diminua de moitié, l'ulcère était
 guéri, il fut guéri dans un mois. Depuis fût une mar-
 chandise et pendant 15 jours on a eu quelle était pas-
 sée guérie... elle est revenue à Paris inquiète de ce que
 la médecine de son pays lui disait quelle avait eue
 la verole... mais les livres et la pratique de la génération
 fait dans le milieu et at et cependant on lui a
 fait subir un traitement et on la proposait un bon
 lui a été administré un autre fois quelle est venue
 à Paris, qu'elle depuis 8 ans elle n'est en aucune
 apparence de maladie vénérienne

Un Cordonnier avait à la lèvre supérieure
 un ulcère qui ressemblait assez à un ulcère cancéreux
 il n'était en. Disait il aucune maladie vénérienne
 femme se portait bien ainsi qu'un enfant et il en
 avait eu depuis l'éclosion de sa lèvre...
 cependant l'ulcère fit des progrès. Les deux lombes
 avec une partie de la mâchoire. cet homme
 passa à un autre qui le guérit par un
 traitement anti-vénérien. quel avait refusé des
 mains de M^r Gullerier. l'ulcère qui avait eu depuis

L'angine ulcéreuse était parvenue à 18 mois dans un
très-bon état. le cadavre avait depuis qu'il avait
eu une gonorrhée avant son mariage qui d'abord des
8 ans.

Les ulcères de l'intérieur de la bouche peuvent se
montrer sur l'intérieur des joues soit paracéphalé
naux, des alvéoles inférieures, soit par d'autres endroits
ils sont consécutifs.

Les ulcérations peuvent avoir lieu
par une cause mécanique, ainsi pour des dents cariées
saillantes, et peuvent les produire sans douzaine de fois
il en a vu des exemples, on les avait pris pour tant
pour des ulcères récurrents.

il y a de plus des ulcérations dépendant de
l'administration de mercure et qui ont l'apparence
bénéfique, comme l'observation qui produit ne peut
avoir longtemps existé en une plus grande portion de
l'abîme, il en résulte une développement des gencives
gencives &c. et de même des humeurs acrimoniaux
d'ailleurs, peuvent produire une ulcération avec
une exudation grasse tenace &c. il y a alors que
les signes commémoratifs et concomitans qui
peuvent donner des signes de la maladie, ou les signes
de traitement qu'on essaye. de même après de

maladies récurrentes, il y a quelquefois des ulcérations
de la bouche qui ne sont pas bénignes, et qui se
monnent à un jeune homme à un âge très-jeune de
eruptives qui reparoissent 6 fois après, avoir disparu
dans des crises épileptiques, parait il fait temporel
donner des relâches des malades soit intérieurement
soit en gargarismes. si les ulcères ne font pas
de progrès, c'est une preuve qu'ils ne font pas
régresser. Cependant, certains peuvent être
stationnaires, comme par exemple l'ulcération de
Dartrey.

grand de membrane muqueuse est parée
grand la diffusion cellulaire est affectée alors les

Les prurits ne sont très fréquents. ce n'est alors qu'une ^{petite} suite
des lésions continuées, quoiqu'éloignées des muscles d'ailleurs -
stimulans appliqués qu'on considère que ces ulcères, prennent
ce caractère ^{convenant}.

Quand les ulcères bien cicatrisés ou guéris au
faible d'une plaie, guérissent au bord, de la direction convenable
pour le meilleur effet, mais il ne faut pas qu'il y ait une grande
dépense d'un des ^{substances}.

Les malades ont des ulcères à l'extérieur des joues, et
de la lèvre inférieure. Quelquefois, au lieu de perforer les joues, dans
les poches, de l'extérieur, en sorte que des ^{colles} de
cicatrisation plus grande, survenue de cette quantité. ^{autres}
cils s'y voit de la lèvre, à la langue. C'est la suite d'un
malade de l'apoplexie et très ancienne, et la femme
avec la gorge, et avait communiqué ces ^{autres} points

La maladie vénérienne est appliquée avec emulsion
et opiacée... Les ulcères sont ^{venimeux} de mort et tout
de peste de substance avait été considérable

quelquefois l'ulcère négligé, est enflammé
au plus haut degré, quelquefois la gangrène s'en
ensuit... il en résulte une vaste ouverture difficile
à fermer et quelquefois la mort est la suite -
de la peste de l'ulcère. ^{aggravé} de chaque
localité et tombant sur un état d'affaiblissement
doubte ne lève pas. ^{avec} dans les foyers de -
gangrène les emollients font les ventouses anti -
tiques pour ^{arrêter} les gangrènes et fit rester une
grande ouverture ou la ferme par une
altération

Les chancres primitifs sont assez fréquents sur
la langue... enfants ^{totaux}... sans baigner les aiss...
application de la langue dans des endroits immenses
et tout cela fait qu'il y a plus de primitifs
que de consécutifs.

Toutes les parties de la langue sont

Susceptibles
 les bords de la langue correspondant à des dents gâtées, peuvent
 en être affectés de manière à être ulcérés et quelquefois des
 cas on a fait subir dans 3 traitements, suppurables

Il y a aussi des ulcérations des aphtes qui paraissent
 pour cause de malade vénérienne, il n'y a que les figures
 comme érosions, conomittans qui puissent se voir les dents
 et encore ces figures ne sont-ils que ratissés. expectations mureurs
 indigues... mais encore l'effacement d'artère peut faire
 persévérer l'état des ulcères, cependant ce n'est pas une
 raison pour regarder toutes des ulcérations sous cette partie
 Comme nous venons de voir par la raison qu'il n'y aura pas eu
 de symptômes primitifs.

Lorsque des ulcérations paraissent à plusieurs reprises
 qu'elles sont superficielles, qu'elles n'ont pas fait de grands ravages,
 on peut croire qu'elles ne sont pas vénériennes.

Un jeune homme avait des ulcérations à la base de
 la langue et dans d'autres parties de la bouche. on administra
 le traitement ordinaire... une ulcération superficielle
 parut sur une autre partie de la langue. l'ulcération se
 guérit 7 à 8 fois dans despace de 8 mois. Le jeune
 homme fut dans son pays, on lui administra le
 Muriate pur originaire de Mercurus à un grain par jour
 il ne put supporter cela, alors on changea et revint à
 Paris... M. Cullerius lui donna le même traitement il n'est
 pas constant que le traitement est même nécessaire
 et lui Cullerius ne l'avait traité d'abord comme
 maladie vénérienne que parce qu'il lui avait dit qu'il
 était venu de la France publique, mais il
 a vu depuis que ce jeune homme avait eu des
 aphtes sur la langue.

Quant à la question
 si les symptômes primitifs et légers 19 à 20 grains
 de muriate purifieront nous pouvons nous
 faire des paraitre mais même nous en sommes
 principaux

et si y a perforation de la langue il faut
 être très sûr qu'il n'y a pas d'inflammation dans
 les bords de la langue, mais c'est rare

il faut continuer plus longtemps l'usage des anti-hémorrhéiques
 si une portion de la saignée est adhérente avec les autres parties
 de l'apophyse, les prononciations des sons sont très-difficiles
 des malades, après avoir perdus les mouvements de la langue
 ne peut plus prononcer des sons ou du moins car ils est
 que difficilement. un indidien ayant la langue
 rouge par de ulcères, neveniens elle a contracté des
 adhérences avec les parties voisines. il ne peut plus
 les mouvoir & se voit se faire de peine entendue
 La langue reste quelquefois dure (Sikreup), et en
 quelque sorte embarrassée.

il faut remarquer que des ulcères, les cancrs
 même de la langue ne sont pas quelquefois venériens.

Les ulcères au voile du palais sont les plus constants
 des symptômes consécutifs de la maladie vénérienne.
 plus de femmes que d'hommes en sont atteints. Les chancres
 y sont rarement primitifs au voile du palais. il n'en a
 pas eu un - cependant c'est un nombre de chancres
 possible qu'il y en ait.

Les chancres lorsqu'ils sont béni ou malin, ils doivent
 et se traiter suivant l'apparence qu'ils présentent. quand
 l'ulcère membraneux avec rapidité qu'il y a douleur infla-
 mation, il faut oublier négliger l'affection vénérienne
 pour se borner qu'à son symptôme. point d'anti-ven.
 qu'on donne alors mal à propos de l'usage de l'antiseptique.
 qu'on dispute lui ? d'une maladie qui se serait
 bien terminée ou en fait une maladie grave et
 tous les jours des praticiens même instruits font
 de ces fautes.

un jeune homme venant d'une femme chancrue
 de cette capitale eut une éruption très-grande
 sur le palais surtout dans la région de la lèvre.
 l'inflammation était très-considérable, il fut
 appelé il ordonna une saignée de bras de 40 lignes
 que de l'onguent à la
 toutes les parties de la langue et

il dit-que si on administrait un traitement anti-Venérien int-
longues, finait par le. ou vers par, l'oules l'écouter. le
jeune homme a été pié de son organe, éprouvé une
grande Difficulté pour la déglutition et l'articulation
des sons. la luttte est perdue.

un autre jeune homme fut attaqué d'une vérole
inflammation de cet organe à la partie recouverte du Palais,
on voulait donner des anti-Venériens, on l'écouter. cette
fois, le malade en fut quitte pour une légère échaume
entre la luttte et le voile du palais. la maladie
devint très-simple. nulle gêne pour la déglutition ni
l'articulation des sons.

quelquefois malade après le traitement par
bain vaginal, soit rempli, la malade a fait des progrès
mais c'est qu'on ne s'y est pas pris assez à temps, comme
d'habitude, l'écoulement a détruit une grande partie
de l'organe on ne peut pas en arrêter les progrès
d'une manière prompte. mais on les arrête enfin,
et si y a des parties de substance de perforations
c'est qu'elles existaient déjà - postérieurement, il
peut être sûr de faire, mais c'est encore la suite
d'une mal autrui. ainsi, par exemple, si y a
une carie, il faut bien que les caries se passent
une ouverture... on fait usage de, delayant le
médicament intérieur a été donné a petite dose
en l'augmentant d'une manière insensible et
toujours en considérant l'écoulement ne produisant pas
trop d'irritation... dans tous les cas ce sont les accidents
occasionnés par la maladie qui font attaquere
partout... car la nature est occupée en quelques points
à l'inflammation des parties affectées.

mais il en est des cas où il faut flammer
les chancres par l'application du sulfate de cuivre
on peut également les toucher légèrement avec
le nitrate d'argent fondus, mais c'est rare il faut
être très sûr qu'il n'y a pas d'inflammation dans

en l'intérieur, quel quefois de l'intérieur à l'extérieur
ou au vu de malade, d'her lesquel la membrane palatine se fuit
il cède quelques cils des os et réciproquement, quel quefois cela tient
ou la membrane se fuit dont la maladie se développe; ainsi si l'os
est carié, il faut bien que la membrane palatine soit percée par la suite
ou ne pourrait certainement pas lui empêcher.

quand la membrane palatine se gonfle grand il y a
une douleur profonde depuis quelques temps qu'on en pressante la
membrane il y a gonflement et ~~grosse~~ ^{une} ~~sp~~ ^{sp} petit bruit comme
s'il y avait un peu d'air en dedans et a l'os on peut presser qu'il
s'élèverait en l'intérieur et il est bon d'en prévenir
le malade.

quand ces ulcères sont ouverts quand l'ulcération est ~~de~~
~~de~~ ^{de} grandes que l'ouverture, on peut laisser les choses dans
leur état ordinaire.

mais si l'os qui veut sortir ne trouve pas un passage
assez ample il faut agrandir l'ouverture quand l'os ne peut
être cassé et entraîné par portions. sans cela il survient
un engorgement au pourtour de l'ouverture et le

la maladie fait quelquefois de très progrès dans ces
parties, que le mal se propage dans les narines, porte jus qu'à
dans les sinus au carie les os, détruit la membrane pituitaire
alors quand on ne peut arrêter la maladie, quand elle
est dans les sinus frontaux, sphénoïdaux, l'air ne peut rien faire
et souvent la maladie est guérie par l'abandon des os supérieurs
et par les chapeaux et les dents viennent enfin.

Les fuites dans mercurielles peuvent guérir les ulcères, des
Voies du palais mais si la salivation est et la suite une
irritation on procède. la liqueur de vausvieten fait
Réparatrice quelquefois elle seule les accide, mais alors la
maladie n'est pas tout à fait guérie, ainsi il faut avoir
recours en même temps aux sudorifiques, et il faut même que
les tisanes soient très rapprochées qu'il y soient
comme en extrait. avec cette précaution les sudorifiques
peuvent même guérir. de même si on donne de légères
frictions

Les ulcères ~~de~~ ^{qui} ~~de~~ ^{de} l'intérieur attaquent les pharynx
et ~~de~~ ^{qui} ~~de~~ ^{de} l'organe est rarement les gencives, cependant

Il en voit des, exemple, & presque toutes les époques de l'histoire
et cependant les praticiens très-âgés qui nous ont transmis
les premiers qu'ils leur ont passés il doit servir les
recueillir en doute... pour les, en convaincre il est à étu-
dier de la leur en administrant les premiers par-
l'inspection et encore vient il pas, nous ajouter
ses yeux faits... oculos habent et non vident: c'est-à-dire

qu'ils sont superficiels adoucis. D'ailleurs, les
délayers & mais quel je passais pas que la maladie
ait été reconnue soit que les médicaments susceptibles
n'aient pas été administrés, les membranes les tissus cellulaires
se trouvant détruits et enfin la maladie n'est
portée jusqu'au corps de ventrôles cervicales. Dans ces cas
la maladie ne peut être qu'éloignement longue. Il faut
la traiter doucement et longuement pour tâcher d'obtenir
la disparition des parties excrues... injections garga-
rismes adoucis & avec des tins de patience de
maladie pourra guérir, mais (et en cas de grave)
et il ne la verra guère fois depuis 18 ans —
cependant la maladie acquise dans l'espace d'un an —
bientôt à quel la déglutition se fait bien des même
que la prononciation de son.

Le larynx peut être attaqué de dedans ou
dehors ou des deux, au dedans. Le 1^{er} cas est le
plus commun. Il s'en a ~~un~~ ^{des} exemples. Les chœurs
ont tellement perforé le larynx que la respiration ne
se fait plus...
Nicolas Massa rapporte qu'un prince français possédait
toute d'un malade renfermé avait longtemps été
de la douleur vis-à-vis le larynx. Il y eut extraction
de sang. Tantôt les frictions tantôt des poudres
avaient été mises à contribution sans pouvoir
le guérir. ~~mais~~ il y avait ouverture au larynx
il s'enrait qu'il perdait si ne s'enrait fait une
ouverture sur cette fenêtre. Nicolas —

necessaire lui fit prendre de la tisane de sauge-parvilles et
de quinquina gay en forme de decoction au cours de 88 jours
l'ulcère et les fistules aériennes furent guéries.

Dans les mémoires de l'acad. de chirurgie on trouve
un exemple de guérison des fistules aériennes également
guérie par un traitement vénérien - J. L. Petit

Le 3^e exemple lui est particulière. une chancre
avait lieu sur une indurée malade dans l'intérieur du
cervix des dedans au au dehors. Il perfora les cartilages
et se faisait jour dans l'intérieur du bassin long ans
de maladie et l'ouverture fut ete guérie, celle-ci était
très petite rebu aut que deux lignes de diamètre. (Nicolas
me l'a dit qu'elle en avait 6 à 8 sur son malade). sans
doute, si on était appelé après cela on pourrât
arrêter une semblable maladie par un traitement
anti-vénérien... Dans l'écrit cas Grad. dans celui de
phthisie laryngée. (comme Maynard éprouvé on pourrât
employer les anti-vénériens, mais il faut qu'il sois
en quelque sorte enchaîné dans des mucosités... c'est d'ailleurs
il est d'ailleurs très difficile de distinguer s'il y a simple-
cation des virus vénérien.

Si l'indisposition est faible caecochyma et venant
de l'age on se développe la phthisie sans symptômes
Vénérien, ni sans qu'il soit exposé au danger de
avoir... Il faut mettre de côté les anti-vénériens... dans
le cas contraire on peut le employer mais avec
le plus grand ménagement. et si l'on ne veut pas
affaiblir le malade, si il faudrait favoriser

La phthisie laryngée gutturale (Bian) pronomie
nécessairement être guérie... il n'en a jamais vu de
cure radicales.

Entre les doigts du pied et de la base de -
d'après il arrive quelquefois qu'il y a beaucoup
de chancre. Il y en a pas dans le moment
dans l'hôpital parce qu'il est au long et
un symptôme prédominant, et en un autre

c'est un nouveau symptôme. ils ont l'apparence des
ragades et a cause de cela on les appelle aussi... on bien
ou les on nomme ulcères louches. c'est un effet ordinaire
de la mal propriété de la paroi des femmes publiques
de la dernière classe qu'on les trouve. car celles qui se-
baignent les pieds n'y sont pas sujettes. ils sont toujours
quasi sentifs... quand ils ont fait de progrès, soit par
la malpropreté de l'indiv^{id} ou par les mauvaises religions ou
bien quand ils ont eu du Deulher & scarbut qui on dardent
alors ils résistent & l'on en a vu durer une année
entière... C. Boulanger qui en avait eue chaque
ortail certain comme il n'était pas guérissable & on
de remède on des doctes ils y eurent bientôt guéri.

quand le professeur entra de Bictre il y
avait une 30^e de femme qui en avaient et on s'est
que c'était une maladie incurable... il ordonna des
adoucissants de narcotiques même des urines les-
avaient depuis 6 mois d'autre depuis un an. il les-
fit suer avec de la chaux trempée dans le baume
de storac... dans 6 semaines ils furent touz-
cicatrisés... depuis il a voulu se guérir le même
traitement et il a vu qu'il lui de guérir bien-
tôt les ulcères augmentaient. c'est que dans le
premier cas il y avait indolence chez lui de les-
maladie pour ainsi dire. mais dans ceux qui ne sont
pas aussi anciens les baumes de storac n'ont pas
suffisamment... y a-t-il de la douleur; le baume est-il
assez fort? il faut de nouveau qu'on tienne
toute la lésion qu'on a lésion... sont-ils
inflammatoires? il faut employer des anti-
phlogistiques. c'est à dire de l'opium de calomel
quand il y a irritation douloureuse
inflammatoire. & si il n'y a que l'indolence
de la douleur.

[illegible]

ch
partules =

Maladie qui attaque les légumineuses mais qui agit
souvent sur les attaques. Les s. et il y a
développement au t. de la peau un grand
suppuration qui prend suite à la persistance

De l'écoulement et qui forme des saillies,
ou appelle pustule, une saillie sur la peau tantôt
avec développement du tissu qui quelquefois s'ouvre
avec l'écoulement qui prend un aspect squameux ou
croûteux, aussi les saillies ont leur siège dans la
peau.
Les pustules ont été le siège symptomatique de la maladie
vénéreuse. J'en ai vu la figure en état de siège
l'un près de l'autre sans faire de la maladie au grand air
aussi un auteur va jusqu'à dire que des deux symptômes
de la maladie vénéreuse sont l'un par fait sans aucun
autre parties génitales, et l'autre au visage et la peau.

La ou lepidémie est épuisée la maladie est conséquente.
 Cependant quelquefois on en a vu sans les lésions, surtout
 lorsque qui étaient certainement primitives, et même
 aux porteurs de l'ou.

On a vu que fréquemment deux fois la figure sur
 les mains et sur les autres parties ^{supérieures} du corps se dessinent. Ce qui
 donne du moins l'air de le croire. C'est qu'autrefois on
 reconnaît l'ait la maladie à cette marque, puis réitéré
 il suffirait pour faire constater les individus qui avaient des
 figures marquées à ce coin. on les conduisait à l'hôpital
 ils étaient punis, et on faisait ceux qui avaient de ces
 se faire traiter au lazaret. On a vu des examens rigoureux
 de l'éclat et de la salpêtrière de l'éclat de l'éclat de l'éclat
 qui portaient telle éruption, à la figure. à présent
 c'est l'inverse. 5 ou 10 malades au plus en ont et on en a
 est bien moins que les autres. Le développement des autres
 l'éclat longuement après le développement des autres
 symptômes. Si toute la habitude des corps en est
 reconvenue il y a eu donc des parties qui en ont été
 plus fréquemment occupées. — Il y a quel

Effets
de la

Il y a quelquefois seulement un changement des
 couleurs de la peau qui est circonscrit. la peau paraît
 comme décolorée dans des points multiples mais
 étendus cette disposition rassemblée à la surface
 des yeux. ces sont petit point blanc dont la
 circonférence est entourée d'un rouge bleu plus ou
 moins foncé et d'une ligne de diamètre on a
 appelé ces pustules formelles elles ressemblent
 en effet à la piquée d'une fourmi ou de piques.

- 2^e Dans d'autres circonstances on a remarqué un point
 tendre transparent d'autrefois sec. on l'a
 comparé aux grains de millet et quand ils étaient
 sans ulcération on les a appelés artilles.
- 3^e mais quand elles étaient artilles terminées par
 un point noir d'ulcération ex-rem de suppuration
 et qu'elles étaient jaunes on les a comparés à

à du millet et on les a appelées milicaires, dans les pays où
on développe arrondi dans les fécules la matière est desfective
et ressemble à du millet qui est calote en jaunes.

4^{es} d'autres fois les millets ont des plus étendue qu'une
convexité, les surfaces sont concaves et ont une
légèrement l'entasse. d'autres fois de lames, des plaques, des plaques
à la galle... on a appelées ces pustules... pustules vénéreuses
galeuses, des galle d'oreilles. = on ne voit pas souvent
mais il y a point de desfecta vénéreux et d'oreilles
l'unité des desfecta il y a point de desfecta (comme
dans les galle... elles ont différents noms pour les formes.

4^{es} Les pustules les plus développées d'une couleur tirant sur
le brun ou les appelées lenticulaires à cause de leur
forme. elles sont ordinairement accompagnées des pustules
galeuses qui elles paraissent être qui le commencement des
autres qu'on appelle lenticulaires; ces pustules ont leur
indistinctement sur toute la partie, mais ne se trouvent
pas dans les parties de la germination, elles sont toujours
conspicues, elles sont quelquefois inégales tantôt unes
suppression tantôt pour suppression... mais dans le cas
ces est plutôt un accident provenant de la longueur
de la maladie et d'un mauvais traitement que de
leur caractère naturel.

5^{es} Quand la surface est plus lisse, quand la couleur est
d'une rougeur plus foncée que les autres est plus
considérable qu'elle est arrondie, on les a comparées
à de petites cerises, à des fausses, mures. ces pust.
mures, ne présentent de différence avec les
précédentes que par le volume de développement une
couleur plus rouge, d'une surface plus lisse. pres-
tousjours elles sont conspécues cependant il en
a une de primitives. elles se développent par
des mêmes procédés que les précédentes
P^{er} celles-ci se montrent avec un léger développement.

avec une excoriation de la surface de la peau au point
de la suppuration avec les dures, int. et affectées pustules
veroleux, d'entrées. il est bien des cas où l'on ne peut les
distinguer les uns des autres, mais bien souvent on s'est mépris
mais d'autres fois aussi les médicaments anti-venéreux ont
très-bien réussi et les ont fait disparaître et réciproquement.

7^e fréquemment j'arrive que les pustules sont avec des croûtes
beaucoup plus épaisses plus développées. la matière qui
l'entoure de la surface prend de la consistance la distend et
alors on a appelé cela pustule, croûteuse. les croûtes
sont épaisses, et ce n'est que le détachement de la matière
si on les entoude il s'en forme de nouvelles. Il est bien
facile de les faire tomber mais il s'en forme toujours
de nouvelles si l'on n'a recours autrement
qui, à mesure qu'il est fait administré, d'une une
depuis lors des pustules qui se renouvellent. quand
elles sont arrondies on les a appelées pustules crues
et quand elles sont inégales on les a appelées
pustules dures.

8^e en a vu des développements en forme de pyramides
sur des pustules, dont la matière est
seulement exhalée avec rapidité. quelquefois dans
les jours de 24 heures il se forme des croûtes de 12-
12-15 lignes d'épaisseur.

un individu en a eu deux fois de
longue qui était comme de fer, une croûte qui avait
cette croûte acquise la forme de même volume. si
le tissu n'avait pas y touché elle aurait par un
volume double. comme ce croûte était oblique des
caractères de pus. Il durcissait de deux en deux heures.

9^e quelquefois la suppuration se fait en dehors et en dedans
c'est à dire qu'elle se développe au point de la première
elle fait des progrès à l'intérieur qui sont
quelque fois jusqu'au tissu cellulaire. alors y a eu
solution de continuité ou les appelle chancres
pustuleux ou pustules ulcérées, c'est le passage
des pustules aux ulcères. Les pustules ulcérées sont

une bubon se présente Le même phénomène que les ulcères, qui naissent d'un côté tend à qu'il se cicatrise de l'autre. Tantôt le d'entérieur tantôt ad'extérieur quelquefois de la circonférence au centre quelquefois du côté opposé. (ce n'est pas le seul exemple qu'on ait vu) il a fait deux fois de suite de même il a fini enfin par appliquer des fers, La Cicatrice a commencé mais libre est morte jusqu'à l'ombilic, le corps lui il n'y avait plus de maladies vénériennes. après cet homme a été en communication avec les femmes sans lui rien communiquer.

16^{co} as appelle tuberculose, les pustules arrondies, profondes, et
celles qui ont une pustule. L'inflammation est avec coloration

comprend les Pustules avec leur développement et avec leur état
sur les appareilles pustuleuses, ainsi la ligne de
démarcation entre les pustules et les végétations, à cet
état de pustules moins développées on voit quelques fois, souvent
des végétations alors la transition est impossible.

La pustule était autrefois le seul symptôme de la
maladie. On ne remarque plus des accidents primitifs
et un (suppuration), c. ad en cela, qui paraissent bientôt
après le coit et en cela, qui ne paraissent que longtemps après,
plusieurs éruptions ressemblent tellement avec les pustules
qu'il faut confondre la cause avec les signes pour en distinguer
les deux. Les pustules, ont été ou

[illegible]

et de faillies. L'abord est fort d'engorgement lymphatique
et sont fers mais enfuite les parties développées s'ouvrent
les bords se remuent et - presque toujours le malade
succombant par la suite de progrès du mal parce qu'il
était difficile à guérir quand il était bien développé
mais pris dans le commencement on le traitait avec
facilité mais était bien plus difficile des que
de progrès. on en a vu plusieurs fois à l'hôpital. J'en
ai vu que dans la grande ville, qu'on veut en voir
un ou deux exemples.

[illegible]

Il faut qu'il existe
 Il y avait articulation entre les deux, des-
 de classes dans la partie qui était la légende, mais on
 pouvait la confondre avec la légende nouvelle. Des-
 auteurs ont prétendu qu'il n'y avait aucune ressemblance
 d'autre, que c'était le même. Dans ces deux cas, et
 quelquefois il a vu des parties, certaines
 avec empressement du type cellulaire et de parties
 environantes qui auraient pu être regardés
 comme un éphémère, mais encore bien développé
 ainsi il pouvait bien y avoir une grande
 ressemblance entre ces deux maladies, en effet c'est
 des auteurs qui ont parlé de l'éphémère.

en donnant des symptomes & différents parce que pour toutes les
maladies il est plus ou moins développé quand ils la voyaient
et supposent de même que dans la maladie venérienne tantôt
on voit des bubons, tantôt des pustules tantôt des chancres, etc.
il faut voir les maladies pour toutes, sans former pour ce-
lles de caractères exacts.

Différences entre les pustules & américaines, et l'éléphantiasis.

Les pustules sont la suite de la maladie lymphatique négligée
quand elle peut consister en elle-même, ou par suite de toutes les
surfaces du corps indistinctement... l'éléphantiasis est
au contraire, localisé sur les membres, en suite aux 4 pour
probablement l'existence de la maladie venérienne.

Les lèpres existent fréquemment avant les plus des
lèpres, et les atteignant ordinairement. Les yeux des peuples, quoique
les personnes riches, n'en souffrent pas exemptes. Les yeux sont
tantôt seulement excoriés... il y avait des lèpres, des
petites, courtes, suppurantes, couvertes par des fissures, qui
donnaient de la suppuration. Les yeux affectés étaient
violentes. Le tissu cellulaire, toute la partie du corps
en étaient affectés. Surtout la figure, aussi on la
reconnaissait aux autres affectés. Quand les maladies n'étaient
pas traitées les ulcères, rougeaient jusqu'aux os, on avait
l'aspect des suppurations et la douleur des ulcères, on avait
et alors la maladie conduisant nécessairement à
une mort prompte.

Il a vu 3 malades, qui avaient les symptomes
de la lèpre primitive. Les uns sur les parties engorgées
couleur rouge foncée, ulcération superficielle et peu
étendue qui prenait la nuit de l'écoulement... bien
plus persistant et était difficile de décider si ces maladies
étaient vénériennes ou non. Deux malades surtout
présentaient les mêmes symptômes qui avait toutes
l'apparence de la lèpre. L'un d'eux par quoi par
le traitement anti-vénérien tandis que l'autre traité
de la même manière eut une exacerbation dans
les symptomes de la maladie.

66. *casos que alle qui no querissint pas per lo tractament ressemblant
plus à la maladie révérenne que l'autre. ainsi, même
aspect, même forme ayant communé des les mêmes Manières
il a vu d'autres maladies de ces genres qui en auraient imposé
à un autre traitement qui s'est fait. on peut bien qu'on
a vu les traitements qui s'est fait. on peut bien qu'on
commencerait de la maladie révérenne il s'en suit bien
avec les complications de la lèpre avec les maladies
révérenne et on ne doit pas être étonné qu'on les
confondait puis qu'on prescrivait les maladies lèpreuses.
Si rare on peut se tromper encore... seulement pour
les distinguer une de l'autre il y a des particularités de
présomptions. mais combien quand on ne voit que des
qu'on voit bien souvent quand on ne voit que des
simples, confondant de la maladie révérenne et les
autres par la confusion de la maladie révérenne.
on a vu des lèpres communes toujours par l'organe
d'excrétion et puis par l'élévation.*

L'année dernière un homme fut atteint d'élévation
qui ressemblait plus à la lèpre qu'à la maladie révérenne
venu de l'hôpital St Louis il fut parfaitement guéri.
Cependant ne pouvant faire distinguer cette maladie
de la lèpre. il en avait tous les symptômes tendis qu'il
n'en avait aucun des pustules de la lèpre... C'était la
suite d'une maladie adynamique. il avait le cou très
gros les lèvres cellulaires infiltrées. on
a vu des lèpres communes les affections lèpreuses sont très rares
que les maladies révérennes les parties de la peau, on peut
sans inconvénient commencer le traitement spécifique de
prime abord sans se les discontinuer. selon les cas

Le lichen était une maladie attaquant plusieurs
figures, faisant des progrès dans un sens, tendis qu'elle
guérissait dans un autre. Il y a donc des pustules, ulcé-
rations, qui lui ressemblent etc. elle avait plus de
longueur que de largeur. La plus grande difficulté
s'est présentée pour le commencement de la
maladie révérenne pour leur distinguer.
des autres qui

point de signe positif. Les signes commémoratifs peuvent servir
des signes commémoratifs rationnels sont quand il y a quelques fonctions
venéreuses, alors c'est une présomption que c'est un signe de cette
maladie vénérienne, mais c'est encore qu'une présomption
car c'est aussi comme les puer ulcération. En extrêmement
rare cette présomption se fonde de plus.

Il y avait une autre maladie cutanée qu'on nomme
Volatic parce qu'elle semblait voler dans parties sur toute
l'ulcération se cicatrises et une autre ulcération se cicatrises
autour du corps, puer des pustules vénériennes sur
s'approchent. Cependant on en a vu d'autres et d'autres
être remplacées par d'autres beaucoup d'autres, mais
les comparais on n'est pas exacte... parce que alors de
maladie vénérienne faisait des progrès.

Échabouure, développement qui se ressemblait
par des pustules vénériennes développement qui croissait
rapidement.

Il existait encore une affection comme l'on le nomme
De laigne dans la face, n'est pas toujours pustule
qui pousse en un peu presque toutes les parties du corps.
(Il a vu des teignes sur la tête qui dépendaient de la maladie
Vénérienne). Comme les enfants en sont ordinairement affectés
si on les rencontre sur des individus des deux sexes adultes,
il faudrait s'informer si la teigne est héréditaire dans la
famille &c. ensuite la teigne fournit une matière jaunâtre
surfacée, tendre que quand les pustules sont vénériennes
elles sont brunes, elles se courent en masse et rend
par Couches comme dans la teigne &c.

Il existait encore quelques fois des maladies cutanées
très-graves qui marchaient avec une grande
rapidité et qui attaquaient le tissu cellulaire sous
cutané et la peau. C'était l'anthrax le charbon
couvrant la marche de la maladie venérienne
est très-différente. Les pustules générales

avec gradation. douloureux et inflammation très-légère, tandis
 que les pustules gangreneuses, le charbon, l'anthrax paraissent
 provenir d'ordres et d'une inflammation très-intense. ce-
 qui les a fait regarder comme une dépendance de la
 réaction des igkles, avaient lieu chez des vétérans, dans les
 hôpitaux. ces pustules gangreneuses étaient très-fréquentes
 à Siétra. elles survinrent dans les hôpitaux ^{indiens} mal famés
 à la suite de la maladie était endémique très-léger et ^{mal famés}
 toujours il y en avait. ^{mal famés} quand un bubon était atteint
 une pustule était ulcérée. de mauvais air le local très-
 et rien l'empêchement des mœurs et tout contredit une
 a engendrer cette complication.

à l'hôpital des vétérans il y a 3 ans que
 74 acalés ont été atteints et dans le département
 de femme. et en mourant ^{mal famés} un seul ^{mal famés} en était
 affecté quand la maladie récurrente était déjà détruite
 on cherche à en reconnaître la cause. tout ce qu'on
 peut trouver c'est que dans l'ouverture d'un dépôt de
 la crosse d'une femme il s'en était échappé une
 suppuration si forte qu'on avait été obligé d'en
 les fenêtres et de se retirer. cependant cette ^{mal famés}
 opération avait été faite dans l'inspiration. ainsi
 la lésion ^{mal famés} avait été surabondante et une
 cause suffisante de contagion, pourquoi le ferait-elle
 elle elle-même indistinctement dans les hôpitaux?
 pourquoi n'aurait-elle pas fait des ravages dans les
 salles des hommes, dans les cuisines de l'hôtel de la
 salle des hommes, à 10 pieds de distance de l'infirmerie
 des femmes? était-ce une disposition de l'air
 de l'air de l'infirmerie des salles? Les plaies de la
 des plaies de l'infirmerie furent néanmoins mis au repos
 pendant une gangrène se déclarait dans un hôpital
 de quel moyen de désinfection est le
 qu'il est de suite les salles, comme au cas
 dans les hôpitaux militaires.

il y avait des esclaves qui venant des villages aux côtés
barren les femmes les jeunes gens emparaient les darts -
tombaient successivement par les os des pieds.

Le prognostic pour les pustules doit être connu
des médecins, guérissent plutôt que les Conduites, mais
celles-ci les ont plus souvent ciels. alors pronostic favorable
guérison prompte. quand l'air est vagabond avec
des affections, pour guérir avec favorable, quand on
plus, l'air. quelquefois il faut des expositions. les pustules
avec ulcération guérissent plus, tantement. quand
l'ulcération gagne d'un côté en se cicatrisant de
l'autre. les pronostic est quelquefois difficile, quelquefois
il faut un air avant que les guérison soit opérée.

Traitement pour les pustules, friction ou
injection. Les indoliges sont inutiles. le traitement
doit être porté assez haut. en fait de les remède
les plus actifs les moins incertains. quant au traitement
général, conformément avec les précédents, il faut des
bains pour ramollir les parties, pour favoriser l'action
des médicaments adjuvants. dans le cas de la
des lésions avec affaiblissement de la santé, il faut
devenir une paille. on doit éviter les aliments trop
actifs, épices &c. pour que les remèdes agissent mieux.

Des pustules les uns sont arrondies depuis une demi
ligne jusqu'à 12. d'autres sont développées en vagues ou isolées
il y en a de plates, de profondes de distance
en distance. d'autres qui les ont fait. le traitement
quoique le plus près la même. Remède parier.
quand les pustules sont accompagnées d'ulcération à
leur surface, il faut une dose de l'agréable, quand
il y a inflammation des parties, on doit éviter
les remèdes froids il faut les baines et ne pas
laisser séjourner cette odeur qui peut y
augmenter l'inflammation. on y fera donc

lotions avec la decoction de racine de quinquina de sureau,
ou fera usage de bain local, quand ces accidens sont
avec douleur on y ajoute de l'extract d'opium, une tète
de pavot, du vin de 30 jours compressé &c.

quand les pustules sont seules, on les froite avec
loisément mercuriel ou... une fois par jour, quelques
deux fois par jour... pour les constituer les pustules ont
leur d'une action qui les font ressembler aux autres, si on
n'y applique qu'un stimulus elles deviennent croûtes,
vites, quelques fois on réussit avec une dissolution de sucre
sur oxygène de mercure, mais il faut observer que dans
les pustules seches qui ne ^{présentent} pas abondamment cette
sécrétion nauséabonde qui les distingue des parafurites, on
vite avec cette substance qui avec la lechete qui leur donne
de la fermeté & alors le mercure agit sur elles plus
facilement. quand des pustules sont très dures & pressées
à l'air dans 8-10 jours quand elles sont plus considérables
il en faut 15-20.

celles qui sont avec tubercules ne donnent pas une
dureté désagréable, sont lisses et s'approchent beaucoup
des pustules consécutives, elles prennent ce caractère
parce qu'elles se ramouffissent les têtes cellulaires s'approchent

quelques fois dans les femmes grasses il y a gonflement
dans les grandes les petites laines, il y a de l'écoulement
dans les parties, il y a douleur les pustules s'écoulent les
malades ne peuvent supporter de contact mercuriel ou bien
lulération devient plus considérable ainsi que l'inflammation
il faut alors altérer donner de douces saignées de calomel
de 2 grains et un peu de mercure aux écorces, ainsi
quand il y a irritation calomel, quand elle est
diffusée écorce. il y a eu telle femme pour les petites il
a été obligé de varier une 15^e de fois le traitement

pour les pustules avec des écoulements généraux on
ne peut le traitement local produit des effets plus

rapides. quand les amygd. ordinairement, about par ce qu'il y a des pustules avec érythème, on applique longueur mercurel alors les pustules passent le flux pour et fin on reste quelque-fois en saignée, mais plus vicieusement ce qu'il en est de la recrudescence et la flaccidité des parties.

quelques fois cependant la maladie n'a été que chose de peu, entre dans la classe des végétations. on a accompagné ces qu'à l'extinction traitant et quand il y a eu quelque chose de long ou au fait la bigature... le traitement intérieur doit être long, continué après, leurs disparitions. sans cela les pustules, reparaissent au bout de quelques semaines, et voilà pourquoi on regardait les maladies comme incurables au commencement. on les abandonnait trop vite sans succès. Les déclamations virulentes, contre les mercures qui étaient apparemment et même des auteurs de ce fait, les pustules reparaissent d'instinct. sans en fait de

mais les symptômes consécutifs, surtout quand il y a complication avec d'autres maladies, que la maladie est ancienne ou ait souffert trop, mais cela n'arrivera que dans fort peu de cas, et les affections vénériennes primitives, jamais de traitement n'est en pareil cas de fait. on pourrait guérir en joignant au mercure dans les piodoriques, mais c'est compliqué de traitement en quelques points, il y a d'autres moyens employés des onguents mercuriels, que des dissolutions mercurielles, les plus pustules comme il a été dit.

Pustules consécutives. Le traitement est à peu près le même. on général qu'on se frotte les frictions mercurielles, ainsi que les mercuriels poudres qu'on se frotte la maladie vénérienne cependant lorsque le mercure est joint avec les piodoriques, on s'en sert mieux. Les guérisons ont été plus fines des bords au point égal. La dose de frictions et de piodoriques, de la moindre dose du mercure est de 24 grains, quelquefois on se sert jusqu'à 40-50 grains le terme moyen est de

72. en de 24 à 36. Dans les frictions il entre de 1/2 onces
jusqu'à 6 onces de mercure doux... au reste de la dose on n'a
aucun signe certain pour indiquer les doses précises et
donner cependant quelques points de vue, ^{quand est} pour se conformer
il faut nous en tenir au traitement de la peste dans
maladies primitives qui date d'une période assez circon-
scrite, tel en est même quand la maladie est simple
qu'il n'y a point de complications. mais quand il y a
quelques années que les symptômes primitifs ont disparu
alors la quantité de médicaments doit être portée plus
haut et plus loin encore quand il y a complications
et que la maladie est plus longue. D'ailleurs cela dépend
de la rapidité de complications, car, quelquefois la
quantité de sucré doit être arrêtée et
quelquefois on en continue l'usage pendant un ou deux
jours, pour mieux... le petit point blanc disparaît
et le pur se dessèche et il ne reste qu'un changement
de couleur de la peau. Les malades en ont présentés des
taches jus qu'aux pieds... une femme surtout avant d'être
toute la peau ^{entièrement} changée de couleur. De couleur à la conception
de thought et encore y en avait il quelques traces... dans
cette maladie la peau paraît être extravasée et il en
résulte une petite pellicule mais à peine sensible... ce
changement de couleur lasts longtemps et quand il est
négligé qu'il existe pendant quelques années il en
fait une autre pour la faire d'3 paraitre.
une petite... désirait fort d'en
être délivrée (elle n'en avait que par l'entremise)
il se servait de compresses trempées dans de l'eau
de soufre de sel et d'alcool. Les pustules
de rougeur qu'elle avait devinrent jaunes
comme dans des erysipèles, il est commun

que ce moyen réussissait. puis qu'il y a des fong extrinsèques...
en donnant de l'asthme aux parties où on est en contact...
on accélère les résolutions. Dans la maladie précédente
on employa longtemps les traitant anti-sécheresses et les f...
complètement guéries. les neurs reprirent tout ordinaire.

puistales cuticulaires quelque la maladie soit confluente
elle est confluence de plus récentes ou quelques puistales c. ad.
qui n'y a que quelques années la maladie a eu lieu que quelques
lans après elle passera l'état miliaire c. ad. à l'apparition
ce qui forme une petite éruption qu'on appelle miliaire. ainsi
les puistales, orifices, orifices, font le commencement de
miliaire. Comme il y a toujours chaleur, une légère
inflammation à la peau. il faut avoir recours aux
adoucissants aux bains. Le traitement général doit
être administré avec précaution ainsi deux quart
de potasse seulement. quand il n'y a plus que des croutes
miliaires quelques bains les font tomber avec facilité

Les puistales, galeuses, ainsi nommées, paraissent ressembler
à peu près aux puistales de la galle... ou galle veroleuse
aux puistales elles diffèrent de celle de la galle proprement
dite en ce qu'elles sont plus grosses, insaisissables, couvertes de
croutes sans avoir été déchirées. de plus les croutes
tombent sans aucune application locale.

Le traitement local est mis en usage quand la maladie
est récente et est peu miliaire à moins qu'on
n'emploie les bains. quand certains de ces puistales
résistent on les oint avec le corat ou l'onguent
mercurel ou bien avec des compresses trempées dans la
dissolution de l'urine ~~de l'urine~~. le traitement
général voy.

quelques uns de ces puistales sont confluents
de cette réunion il résulte une irritation un
mouvement d'humour ichoreux qui exerce les
lorsque et donne l'apparence d'ulcération.
de ces puistales se rapprochant du caractère de

puscules d'artreux. Dans pareil cas le traitement
local doit être employé. Delayez adoucir les carreaux
bains plus fréquents sur les ^{parties} ~~parties~~ ^{exposées} d'acrobies, en les
trempant dans le lait quand il y a pas beaucoup de
douleurs avec la fleur de soufre, et les talcs de porcelaine
quand il y a douleurs &c... ces pustules sont celles qui
guérissent avec la plus de facilité.

Les pustules cuticulaires sont assez rares. on en
voit cependant plusieurs exemples (2. 10. 8) elles sont
plus difficile à guérir que les galeuses parce qu'il y a plus
d'engorgement &c, ces pustules guérissent plus ou moins
promptement suivant que le grand a été plus ou moins
organisé avec ce développement sur quelques parties.

Lorsque les pustules ne cèdent pas au traitement général, on
ajoute du bain et qu'on ne soit pas généralement repoussés
on s'applique dessus le cerat mercuriel. quand elles sont gué-
rissant repoussées il faut avoir recours à la saignée du crâne
qui pourrait résulter de son action une exhalation de
dans les voies digestives alimentaires, ou bien la saignée
aussi il faut les froter successivement... quelquefois
ne pouvant être repoussés en suppurés ces pustules ont
été frappés de gangrène. il en va quel peu fois mais
rarement = une malade entre toutes les personnes frappées
de gangrène; dans une 15e. de jours tout presque sur
l'extrémité mais la gangrène ne se porte pas plus profondé-
ment que dans les parties affectées... ce qui y a de
singulier, est qu'après une autre malade n'est
affectée de gangrène, il y a eu pas partie de
résistance la gangrène s'étant circonscrite dans
l'étendue des pustules. on a donné des emollients
à l'intérieur avec un léger acide étendu comme
ordinairement dans de la tisane de chicou
choudeur &c point de quinquina point

De camphre dans les pústules de la face, mais quel est le point de
disposition le plus convenable dépendant de la disposition.

Les pústules ^{parfois} ont une surface lisse, point de gran-
sures. Dans les pústules entières, elles sont tout à fait lisses
tantôt mêlées avec les précédentes, ordinairement elles sont
conspicues. on en voit peu toutes les parties du corps, on
en voit quelquefois avec une surface lisse, quelquefois elles
sont tellement lisses tellement rouges qu'on les prendrait
pour de véritables maris, appliquées sur le peau. Elles
ont une couleur ordinairement moins foncée que les
autres, ^{et} après qu'elles ont existé un certain temps, et avant une desche-
neur d'effluve albugineux, c'est-à-dire il y a plus de peine
à les faire disparaître. alors l'application locale est
indispensable. Car le traitement général serait
insuffisant ou trop long. quelquefois même le cir-
cuit est suffisant. jamais il ne faut les laisser
se rompre, on ne les touche que quelquefois, et on les
soigne pour les guérir. quand elles sont très-volumineuses
l'on seurt le peau d'elles, longuement, flaque. et on
efface plus une tumeur est volumineuse, plus elle
est d'endure, plus difficilement elle revient sur
elle-même, surtout quand cet état a duré longtemps
en la guérissant, quelquefois on la fait antea ^{partir}
que si c'était de ces pústules, elles sont ordinairement
sans douleur ou moins que quelques autres, ne venant
ne s'y trouver compris. a lors le malade s'aperçoit
de l'irritation, quelquefois même une douleur
lancinante. si on l'applique ^{des pústules}
une ^{moquette} de plus, pour que les pústules
il y en a qui sont dans l'insupportable gêne.

Les pústules avec exoriation ou esquames
franges, fendues, les pústules d'oreilles, d'oreilles
recouvertes. &c.
font-elles dépendant d'une vétille
ou d'une cause, elles en dépendent ou pas. La

Difficulté est bien considérable ici pour le distinguer
quelques fois les dartres existant avant la maladie vénérienne
autres il peut y avoir d'abord une maladie vénérienne, puis
l'affection ven. peut se compliquer avec elle. Le cas le plus
en plus grand si la maladie est exposé à gagner
la maladie l'affection d'abord n'est parvenue qu'à

dans les communs dans d'autres cas il y a des éruptions, des
croûtes, suppurations, de distances ou d'intervalles, l'homme
suppuratif qui donne de la démanaison. Des prurit
ou quelquefois de la douleur. Le prurit est plus ou
moins variable &c. il y a point des signes caractéris-
tiques pour indiquer les opérations qui se lient entre
autres, entre de darts, les symptômes, au point le même
il y a que le prurit à laquelle la maladie a com-
mencé qui puisse fournir des données. mais c'est
elles, pour enlever d'ignorance, il y a de voir que
le traitement quand administré qui fait de
véritablement prurit de loucher... quand il y a
darts généraux. Le traitement général
aide à de baigner, il y a des contraires il y a
complication. Le prurit est le cas où on
la maladie vénérienne a développé l'affection
d'abord. Les quand au contraire on emploie les
sulfuriques, et le mercure dans des affections qui
ne sont que d'abord, cette éruption se transforme
surtout il se forme des gercures, des ulcérations
les croûtes deviennent plus épaisses les dartres
plus douloureuses. il en résulte encore un mal-aise
général. Si tant is que dans un cas de prurit une
affection vénérienne. d'abord il disparaît
c'est à dire quand la maladie est ^{incurable} ~~incurable~~
ou d'abord ou vénérienne... mais si il y a
complication de ces deux affections alors on
en ablige d'employer bien plus longtemps les

traitement, ainsi qu'on en a vu un exemple dans une femme qui
 se trouvant dans un malheureux cas, tantôt il a employé les
 emollients, tantôt les évacuifs, puis, sur les indications, il a
 donné à l'intérieur des adoucissants et même des laxatifs et enfin
 il a appliqué une excoriation pour changer le mode d'irritation
 il a été suivi d'antécédents de végétations... cette femme guerrie
 sans doute mais ce n'est qu'avec beaucoup de lenteur.

pustules, Croûtes. Soit qu'elles soient rondes, soit qu'elles soient
 longitudinales, soit qu'elles aient une forme péricarpiée & les
 bords, surpouvant insuffisamment, contra elles, employer le calcaire
 mément pour faire tomber les croûtes, on évite les pommades
 de Cérille = quand le traitement a été adjuvant tra-
 vers 15^e de jours, les tubercules diminuent les pustules, puis
 alors à peu près les altitudes paraissent totalement et la
 maladie guérit sans apparence. car les symptômes dispa-
 raissent d'habitude avant que les maladies vénériennes fin-
 de suite dans son principe. = Il a vu une pustule
 qu'on traitait d'éczéma de parois & fait par jour, puis au-
 trator la guérison on se servit d'un calcaire au bout
 d'un mois il n'en parut plus de traces.

pustules avec ulcères ou excoriation de la
 conjonctive dans les téguments les téguments cutanés pour
 Cutané. pustules ulcérées

qu'on qu'elles soient souvent les suites de pustules croûteuses
 des demeurant un traitement local difficile. ces pustules
 ne sont presque jamais telles que consécutivement à l'éczéma
 de défaut de traitement. elles ont communément pour être
 croûteuses. leur suppuration était corroïve acrimonieuse.
 voyant pas trouver de voies pour les chasser elles se réag.
 sur les parties & au contraire se rapprochent de
 celles qui avaient été autrefois sous le nom de l'éczéma. dans
 ce cas il y a toujours une inflammation quelconque
 dans le tissu cellulaire, quand les pustules sont
 d'éczéma par-ci-par-là alors elles s'en vont par

L'opprement, il faut en effet qu'elle finisse. Combien de fois pour
paraître comme l'opprement. quelquefois il y a une demi-
pouce de purpura et même d'autant plus. Cette maladie
ou cède au traitement anti-vénérien. Le traitement
général est le même mais doit être porté plus loin.
Mais quelquefois les parties affectées ne se meurent et
finissent par se guérir. C'est traité d'une manière
inconvenante soit parce qu'il n'a pas été traité du tout.
Ou parce qu'il a été obligé d'attendre plusieurs mois
afin de rappeler les forces du malade avant de les traiter
de la maladie vénérienne. ^{à l'effet} Il faut savoir que quinze
et des fortifications. ensuite il a commencé par
donner le sirop anti-vénérien le plus originaire.
et employait les toniques même et en même temps
de mercurio pur exigent à une petite dose. Sans
ces précautions le malade ne résistait pas à ce
traitement anti-vénérien et il mourrait avant
par ce traitement que par les progrès de la
maladie. au reste le traitement est très-
long. il faut le continuer 6 mois une an-
quelques fois &c.

Lorsque la maladie a été traitée localement il
faut examiner jusqu'à quel point la guérison en est faite
de cet état mercuriel irrité quelquefois trop la surfaillance
ainsi quelquefois on ne peut employer sans inconvénient
on y joint alors les détergents, quelquefois on y emploie
les digestifs quelquefois on y ajoute du longment
ou on se contente de qu'on appelle gégastifs mercuriels
ordinairement en passant pour les détergers
mais il est des cas, où ce médicament légèrement
irritant ne fait qu'augmenter la maladie. Dans ces
cas on relâche ou calme, ainsi on use quelquefois
de decoctions emollientes faites par exemple -
amary

avec les graines de lin les maceratiues, la dissolubilité des traites
gommées d'opium ou vin d'opium ^{Composés}.

quand l'iritation est encochée il faut en venir aux digestifs
simples et quelquefois aux digestifs mercuriels et quelquefois au vin
il faut éviter les remèdes qui ont des effets C. a. d. altérer les
tissus, toujours suivant les circonstances et par là on parvient
à guérir les parties des pustules... au reste ces ulcères peuvent
devenir cancéreux par un mauvais traitement.

quelquefois ces ulcères vont jusqu'à des suppurations
quelquefois après avoir percé la peau ils s'ouvrent ^{par la} pour le
remède tissu cellulaire sans que les vaisseaux des téguments aient été
attaqués... il en résulte des clapiers et autres complications plus
difficiles à guérir. Les médicaments ne peuvent être employés
sur toute la surface altérée; alors il faut mettre à découvert
les parties atteintes ou plutôt les porter et alors on emploie
des digestifs mercuriels &c.

quand les pustules ont attaqué les parties molles
peu épaisses des os comme par exemple à la région
de la tête &c. elles attaquent les os et on ne doit les
laisser cicatriser qu'après que l'os est guéri.

Les plus difficiles à guérir (de ces pustules) ce sont
celles qui sont accompagnées de cicatrisation de la tête tandis
que des autres elles forment des progrès... l'échec des pustules
ulcères... au zig-zag s'empêchent &c. c'est toujours
une maladie consécutive, elles sont quelquefois
seulement superficielles mais très-fréquemment elles sont
compliquées de lésions de l'os des vaisseaux sanguins qui
existent avant la maladie récurrente.

Dans les 1^{ers} cas quand elles ont atteint les malades
guérir assez promptement. Il en a peu guéri dans
les 2^{es} parties des 15 jours malade quelle est la proportion des
délors des d'abord les longes.

il est quelquefois nécessaire d'administrer
un traitement interne, quand le docteur est
médecin. Traitement anti-vénéreux comme pour
une maladie consécutive. quand le docteur est
très-grand et qu'il y a inflammation dans les parties
subordonnées alors il faut les

quand la cicatrice commence à se faire sur elle, quelques
fois douloureux colmatant ou seulement froids de propriétés.
Dans l'inflammation et les douleurs molles, les
calmeurs narcotiques sont très-avantageusement employés localement.
quand l'ulcère est devenu indolent ou plutôt que la
douleur est calmée, il faut faire venir une cicatrice anti-phlogistique
et quand on est parvenu à calmer les symptômes d'irritation,
le même traitement qui est administré dans les cas ou les
maladies vénériennes sont compliquées conviennent alors.

Les quelques foyers de douleur si l'ulcère est rougeant et
faut porter à une fétide de grains de mûre et de fétide.
Maladie malgré cela, fait de progrès, il faudrait
changer le lieu de son application de ce, ulcère. C'est
sur la face de l'ulcère, anti-phlogistique, on commence par y
appliquer une caustique active telle que la nitrate
d'argent fondue mélangée avec une très-petite quantité
tandis que le bœuf d'anti-moine ou le mûre d'anti-moine.
sublime est plus actif. La potasse caustique fait aussi
une escharre plus profonde. La cautère potentielle dans
pas encore suffisant quelq. fois et il faut avoir recours
dans ce cas au cautère actuel qui brûle seulement
les parties ulcérées, mais encore les parties environnantes
et par ce moyen on a une plaie simple.

Un homme avait un ulcère de mauvais aloi —
matériel à une. Les chirurgiens y tombent
sans dessus... il en résulta une pustule ulcéreuse.
L'ulcère fut traité avec certains soins et un certain
soin neurent de la partie pour y déterminer
l'inflammation... il fut formé une escharre —
volumentaire... qui fut détachée formant un ulcère
extérieurement étendu et noir qui se cicatrifa —
dans lespace d'un mois, étant bientôt devenu
de bonne nature. Cet ulcère se rapprocha
des pustules rougeantes de la face du
corps.

Les pustules ulcéreuses soit fongueuses, soit d'une autre espèce
 guérissent facilement mais quand elles sont compliquées, d'une vicié
 Propriété cancéreuse &c. il faut les combattre d'une manière
 différente et être sur ses gardes par les moyens qu'on emploie
 quelquefois les principes cancéreux par exemple est si fort
 qu'il fait toujours des progrès, quel médicament qu'on
 lui oppose.

Les pustules en forme de végétation. ce sont celles qui
 conduisent aux excroissances. on a appelé ainsi, tout
 ce qui survient notamment aux parties de la génération
 mais encore sur toutes les autres parties du corps. C'est au
 développement organique au lieu que les pustules ne sont
 que organiques. C'est à dire qu'il n'y a point d'action sur
 des os.

Les excroissances ont été appelées Condylomes, char-
 tumeurs en forme de Condyle. elles ont ordinairement
 deux degrés de portées de peau plus ou moins élevées. C'est
 ordinairement aux environs de l'anus qu'elles ont leur
 siège. quand les excroissances semblent provenir de la peau
 au lieu d'être une végétation par laquelle se
 développent ordinairement la membrane des vaisseaux et
 au lieu d'être une végétation d'abord
 quand elles ont une forme petite arrondie ressem-
 blant sur pied de loup ou sur la forme ou les appelles
 végétation en forme de grappe.

quand la surface est unie plus volumineuse
 couverte de petits points on les appelle Végétation
 en forme de fraise de framboise
 indiquant elle est unie et quelle se dirige en
 branches, et ramifiée et on les appelle Chou-fleur
 il n'y a que la couleur qui leur fasse défaut. quelques
 fois il y a une tige qui... on les appelle perles
 il y a excroissances quand il y a un tubercule
 arrondi qui ressemble à la noix d'un pois.
 ce développement leur donne un caract d'...

de la végétation mais il pousse des peaux sur les parties
et alors il y a excroissance développement dans le tissu
de la peau et ceci lui fait avoir des rapports avec des
végétations.

Les végétations sont plus ou moins nombreuses et
s'approchent ou s'éloignent des maladies qui ont occasionné des
masses énormes au porteur de la tumeur au périoste à des vides
d'autres, nous présentons que quelques uns, a été pas à
l'existence de la maladie qu'il faut attribuer les
grand volumes qu'elles peuvent présenter, car celles qui
sont volumineuses, sont ordinairement dans un progrès en
très-petit de temps.

Choux fleurs

ils ont deux sièges à la face interne et externe du prépuce
quelquefois dans les bourses. par conséquent portent de la même manière
chez les femmes entre le vagin et le clitoris.

ils sont primitifs quand ils sont venus par les
parties, même on les verra à l'état de prépuce. Conspicue
quand est par une partie où il n'y a pas eu de
contact. quelquefois de la même des choux fleurs par
quelques fois.

Il n'est pas rare d'en trouver à l'intérieur de la
bouche. il en a vu sur la lèvre, et sur un enfant
à l'extrémité de la langue. mais alors ils sont
peu durs et se présentent sous la forme de
fruits de framboises avec cette différence qu'ils sont
applatis apparemment à cause de la compression
qu'ils éprouvent dans les fonctions respiratoires et
la mastication et la production de jus.

à la face intérieure de la langue, de la gorge, et
sur les parties intérieures de la poitrine sup.
à l'inférieure qui ressemblerait à des choux fleurs
dans le conduit auditif il en a vu
un assez volumineux pour avoir pénétré
dans le conduit, mais cette excroissance ne ressemblerait

43 ni aux groffes, ni aux foibles. on auroit pu le comparer
à une cerise. c'était plutôt un polype qu'une écorce d'orange,
rougeurs pareilles. C'est le seul exemple qu'il ait vu. dans l'écrite

La partie intérieure ou externe de la cule quelques fois à des
Rarément. Cependant on en trouve quelques fois à des
parties supérieures internes et externes de la cule quelques fois
de peau du pubis recouvertes depuis. il en a vu 324 fois
au dessus de l'ovaire.

il y a une écorce qui vient fréquemment à
L'ovaire ou aux parties génitales. C'est la cule de 20 espèces de
hyaline ou blanches. exploration de petites végétations
de découverts... affermeant qu'il y a des végétations indépendantes
des vides récurrents

il y a des glandes femelles avec des végétations. Sur les petites
et les grandes lèvres. Les végétations au-dessus de la cule il
crus deux états de produits de la machine récurrente. il lui
lui dit. son mari souffrait d'une bonne suite aussi que deux jours
pour qui les voyaient. (Batare) Conflète fut des suaves. ce pendant
le traitement fut administré tel qu'il était.

une femme connue au nom de végétations à L'ovaire qui
guérissait tout à fait avant.

une femme grosse avant de changer de végétations
en forme de grosseur de lèvres. son mari souffrait fort bien. prout
d'avant. et le fin de la grosseur ou bientôt après l'accouchement
le tout disparaît sans autre moyen que des végétations sur les

une femme de 30 ans avait des végétations sur les
grandes lèvres. elle habitait dans le même lieu. de simple
lotion les végétations disparaissent. elle changea d'homme qui ne
gagnait rien de nouveau avec elle.

un homme jeune femme avec des végétations
alternativement. C'est-ci. Les végétations sur les parties
de la femme elle voit très bien portant de l'avant... au bout d'un
mois de jours il y en a plus. quelques fois après le mari

cy ont sur le prépuce. elle souffrait tout à fait
dans et dehors. Depuis l'accouchement la femme a accouché
à l'ordinaire. Le mari a vu encore affa-

u fois de l'usage de la cule. La mari avec encore affa-
cassée au vu de la cule. La mari avec encore affa-
de prétend un virus récurrent à une jeune fille
point de la cule. c'est une jeune fille

Il est de toute impossibilité de distinguer entre les
les végétations nous venons de citer, qui ^{ne le sont pas} il est
quelques fois, commémoratives, et les autres rationnelles pour combattre
et encore... Dans les cas de doute il faut temporiser
si les circonstances permettent ou ne permettent pas de
descaler, si elles tombent sans traitement anti-ven-
si la maladie n'est pas compliquée le traitement
est inutile mais il fatigue.

Le prognostic est très favorable, point de danger... car
les végétations sont déagréables à l'intérieur, elles sont souvent
très difficiles à guérir. quelquefois elles disparaissent presque
après 6-9 fois après avoir été enlevées... il y en a
même qui disparaissent toujours quelques jours après leur
expose.

traitement muricé ou frictions. la végétation
est quelquefois au début général mais est rare...

Dans une allusion de, qui a donné lieu à une légende
vulgaire qui fait regarder les maladies vénériennes comme
incurables, après le point ^{après} ^{après} dans 3 jours les

par les cataplasmes ou bien les cautères, ou bien
ou en frottant la lésion ou l'écoulement

de l'urine & renaissent souvent à la guérison et à la fin
tombent. quand ils ont été inutile on fait usage

d'un autre qui nous guérit renaissent toujours et qui
cette. les autres peuvent malgré qu'on leur donne il y a
quelques années comme certains le savent très efficace.

Dans la végétation première, dans celle qui est venue
vermeille, et qui n'est pas étendue épaisse ou ex-
cessives est le plus facile à guérir.

Malgré ce fait, il faut purger les végétations. les végétations
ou en coupant les vers de la prostate et la tumeur

amalgamé

plusieurs applications, et alors les plus grandes précautions sont nécessaires. il est inutile d'appliquer les thésisiques, de l'usage de plusieurs infusions par trop vives. Les ganglions lymphatiques de toutes la partie. La maladie fut guérie... une femme avait de semblables végétations aux parties génitales de l'anus - applications = huit jours il fallut les mettre dans le bain.

Dans les autres cas la destruction des végétations fait faire de grandes douleurs dans le second elle avaient été atroces. ce qui m'a fait que les caustiques ne conviennent pas à tous les individus, il faut tenter d'abord leur sensibilité aux quelques parties... ainsi il ne faut faire d'applications que sur une petite partie et quand on s'est assuré par là que la sensibilité n'est pas trop exaltée on peut l'appliquer sur toute la partie.

La ligature elle convient dans les tumeurs, mais nous quand la base est large quand ce sont des polypes. quand ce sont des végétations en forme de fraise et la base large quand les végétations sont confondues les unes avec les autres, quand elles sont en forme de pectus, &c. ce n'est que dans les végétations en forme de grappe de cerise qu'on peut en faire usage. D'ailleurs que sur les crêtes des - c'est quand elles sont arrivées et qu'elles sont pas une large base.

cette application est sans danger, ordinairement on a cependant peur de grandes douleurs quand les végétations sont très unies. il faut faire saillir un peu les végétations pour les prendre les tigeurs dans la ligature. La constance est plus douloureuse mais la guérison est aussi plus sûre.

quelques fois les malades ne veulent ni du fer ni des caustiques. alors il faut avoir recours à la ligature. une femme avait à l'anus une crête des - c'est quand elle est volumineuse. et voulait en faire l'excision

elle s'y refuse. il en fait la ligature. la partie liée avait
de 8 lignes à un pouce de diamètre et j'en fis la ligature pendant
5 jours / on eut fait charger de ce foin... Mais les malades
ont les règles dans cet état... quand il traînait il n'y avait
presque rien à Couper mais il y avait toujours deux heures de
il fallait avoir de nouveaux secours à la même opération...
aussi une fois qu'il y a une échancrure il faut mettre entre
de la charpie ou une emplâtre ou du linge

C'est ainsi que vous voyez quand les autres moyens ne
bientôt être appliqués sans danger et même sur les malades
qui ne resteraient pas tranquilles après la ligature dans
les cas où elle conviendrait. Les caustiques deviennent
beaucoup de temps quand les végétations sont nombreuses
voilà pourquoi on ne fait rien par dans ces cas dans
cet hôpital.

quand les végétations sont nombreuses on se sert du rapier
ou du bistouri. celui-ci est préférable et est plus aisé à manier (surtout
surtout) quand les végétations sont prolongées, allongées, les ciseaux
à plat conviennent. quand elles sont dans des anfractuosités comme
derrière les lèvres du gland on s'écartere les lèvres et la bourse et
dans les femmes entre les grandes lèvres, sur la petite de l'intérieur
dans le vagin derrière la fourchette & dans les deux sexes on porte le doigt
de l'index & présente une courbure à la ciseaux. Combien de fois
il s'est passé un singulier objet il faut faire alors des incisions multiples
digne. c. ad de bas en haut afin que le sang coule tout vers le
droit où l'excision a été faite de sang les courbes par les parties qui
sont encore existantes.

Si les grosses végétations courent de petite. l'excision
est à faire alors à des jours éloignés pour ne pas trop aller
sans y voir et pour ne pas s'écarter de la bourse de...
qui doivent être extirpés.

Si les végétations ne sont pas très nombreuses de l'index
et qu'on le voit de la main on voit les ciseaux ou faire
l'excision mais il est difficile de le faire quelques fois on se
sert alors des ciseaux courbes, il en est de même dans le
vagin. ces végétations ne sont pas fréquentes dans l'homme.

Dans son intérieur.

Il y avait une femme dont le vagin et l'anus
étaient formés par des végétations. Il aurait fallu faire
amputer toute la membrane interne du Vagin. Il y
introduisit donc une incision concertée d'ouïement
M. Mercier recouvrit de la peau en poudres ou de pulvé-
riser de cuivre. Les saignées furent diminuées et les bontés
dans quelques mois les malades fut guérie
Il y a dans ces qu'une fille échappée de la dis-
cours avait des végétations considérables, elles étaient
pres extérieures. Les extérieures furent excisées les intérieures
restèrent ténues, elles accouchèrent... il y en avait presque
sur le col de la matrice. 15 jours après l'accouchement
il n'y en eut plus, aucun.

Si elles persistaient malgré les applications
extérieures il faut faire usage des caustiques aux
branches, alongées et racourcies, mais il faut que les
végétations soient 6 cm. détachées et ne soient pas
trop nombreuses, alors on peut les enlever en totale
l'état fin ou on applique les caustiques.

quelquefois les végétations rassemblées font
dans l'endroits qu'elles occupent soit dans les ventres
environnantes soit autre part. Ces cas sont rares —
mais il est des anomalies qui présentent cela de particu-
lier.

une femme a été excisée 6 fois... ces
végétations paraissent-elles ^{reparaissent} tout à fait spontanément
à présent.

une jeune femme en ville en avait qui furent
détachées par le sabine en poudre. Elles reparurent
lorsqu'elle se fut faite. et les redoublèrent dans les
parties environnantes et les excisa encore plusieurs
3 fois. elles reparurent encore alors il les excisa
elles furent toujours revenues et les opérations
successives ~~successives~~ qui ont été faites une 15-

de faire ont été inutiles. voyant cela il a engagé à faire
l'usage de la saignée à elle-même et a fait usage de saignée
comme auparavant. au bout de 4 jours elle out disparu...
peut être l'irritation était allée au cœur de leurs reproductions
ainsi quand les végétations ne dépendent pas de la
maladie récurrente, les individus qui les ont ne peuvent
pas la communiquer il ne faut plus les tourmenter lorsqu'ils
résistent. Bubons vénéreux page 89.

Bubons indolens.

quand les bubons sont indolens il faut les ramener au
point nécessaire pour qu'on puisse obtenir une bonne terminaison
on doit entendre par bubons indolens une tumeur flegmeuse
douce, sans rougeur sans chaleur sans inflammation essuf.
cependant il est bien reconnu aujourd'hui qu'il ne peut se
former de tumeur sans inflammation, mais elle est faible
cachée latente dans ces sortes de cas. le douleur n'y est pas
assez forte pour que la maladie puisse se plaindre, il n'y
a point de changement de couleur de la peau.

on a prétendu que les bubons indolens étaient
attribués des personnes débiles, lymphatiques, que les bubons
inflammatoires, étoient l'appareil de personnes sanguines
et que chez les bibles de bubons étoient accablés pour-
caractère prédominant. La douleur &c. tout cela est
d'ancien temps l'expérience. on voit tous les jours
des individus très vigoureux être atteints de bubons
indolens comme aussi des ^{gens} lymphatiques.
avoir de très-inflammatoires. et ne voit on
pas encore les symptômes de la même maladie
paraître sur la même individu des caractères tout
à fait opposés c'est, les uns être inflammatoires
brûlés que d'autres sont indolens? &c.

on voit quelquefois deux bubons liés à côté l'un de l'autre
dont celui d'un est inflammatoire et l'autre indolent =
sur le même sujet (V. 106)

il faut traiter ces bubons suivant l'indication
locale.

Si le tumour existe depuis plusieurs semaines, si elle n'est
pas sensible au toucher. Si le malade marche avec différents
pains, on s'est accoutumé de le traiter par le conseil
c'est d'abord le traitement général qui consiste par un
combattre les principes de la maladie et ensuite de
traitement des symptômes doit être et général et local
on emploie ordinairement dans l'hôpital des pillules
fondantes, ou plutôt stimulantes ^{parfois} avec
d'un quart de lavande de potasse d'un quart de rhubarbe
et un quart d'aloë purgatif... elle font un peu
purgative, mais à la dose de 3 à 4 grains
mais d'un gramme ou deux elle, ne font que stimuler.
on donne aussi avec succès des pillules de mercure
improprement appelées pill. de Colost.

Ces pilules pas de mercure qui est fondant dans
ce médicament et sont plutôt des autres substances
qui y entrent il y a outre du diacorde de S^{or} et
scurmoué qui ne font que stimuler, donnees
de 16 à 24 deacayhaumes, on peut donner des
tisane de fumeterre de petite scabieuse et autres
plantes un peu stimulantes, mais est principalement
par des parties, elle mêmes qui font parties des lachry
aussi des emplâtres, qui ont davantage eu retenu
les transpiration de les faire réagir sur la tumeur.
Le corps gras qui stimule ainsi de deacayhaumes
ou d'emplâtre de veige avec le mercure et autres
on il entre tantôt des pilules, des poudres tantôt
met alliees mais toujours associées avec des substances
grasses. quelquefois on fait des frictions mercurielles.

Surtout et, un peu au delà. De bord à bord même de
L'effection est un mouvement imprimé à la tumeur adolente, agit
L'action de l'anguine mercuriel qui est stimulante agit sur
La surface de la peau. Le mercure est absorbé, stimule
Les glandes lymphatiques, les vaisseaux et les, prépare à ramener
La tumeur à l'état de circulation. ces moyens s'olent, caracéris
Produisent la suppuration et la résolution. Dans les cas on
La traite comme les bubon ulcéraux. dans le 2^e cas rien de faire.

Mais, quelquefois les tumeurs ne font qu'aug menter
De Perité; alors il faut faire usage des douces, affaibles, qui
En agissant et par leur présence et par la substance, qui
Les compriment, produisent la résolution de tumeurs qui avaient
Résisté plusieurs mois et même de années. Pour cet après, une
Deux douces, la surface de, bubon se trouve excoriée. Il est bon
De laisser ulcérer un peu profondément l'appareil, parce qu'il
Se produit par là souvent dans le reste de la tumeur une
Inflammation salutaire, quelquefois cependant il faut
Surveiller les douleurs, et c'est lors que la douleur est trop
Considérable ou que l'ulcération pourrait aller trop
Profondément, mais on peut y remédier à 8 jours après
Car alors l'ulcération s'est cicatrisée.

Un homme avait 3 tumeurs comme des œufs de
Poulet au sein, il n'osa se faire employer les médicaments
Mercuriels - Vénériens mais bien des douces qui
Produisirent une diminution de tans. il en fit usage
Pendant trois mois et par là les tumeurs qui avaient
Résisté à plusieurs moyens Disparurent.

Quelques fois elles achouent, parce qu'il y a des tumeurs
qui sont tellement adolentes qu'elles s'échappent par elles y
Rappellent les circulations. on peut les guérir par les
mes peuvent rien faire il faut y appliquer une
Gélicatoire qui, quelquefois ulcère non seulement les
téguments mais agit encore plus loin par les douleurs
qu'il y excite; on peut se servir de la tumeur
de cantharides qui produit le même effet.

de même de l'alkali volatil avec de l'huile... mais il
en est encore qui y ont résisté et qui se font saigner dans
la fosse des tumeurs, qu'on appelle incurables.

Si après avoir employé les fons au à l'interieur
sur la tumeur on s'apercevait qu'elle devient douloureuse
si la surface s'en devenoit inégale, si la tumeur prenoit
trop de consistance si elle prenoit les caractères de
Squarre il ne faudroit pas continuer l'usage des
les moyens... si par exemple après l'emploi des
emplastiques, avec les caractères pressés, la tumeur
s'échauffoit davantage plus dure alors emolliens, calmans
et quelquefois même narcotiques. &c.

Il en devroit être de même si elle prenoit
ces caractères après le saignée... et alors certainement
les remèdes seroient nuisibles, &c.

La tumeur inégale douloureuse on doit la traiter
comme quand une tumeur veut se terminer par la
squarre, alors il faut combattre ce qui peut s'échauffer irrité
la tumeur... ainsi calmans, calmans, narcotiques, &c. pour
adoucir. delay. grimes blins avec telos de pavot
auxquel on ajoute les mercuriels ou les saignées &c.
germes de lin avec le vin corrigé par la decoction
de ténacité de pavot de mercuriel ou y ajoute même
le vin de piment composé, de piment lui même sur
la partie &c.

Si ces moyens sont adjuvants, aller à l'usage
on ramène l'asthme au état d'indolence et alors on
peut s'en tenir là et respecter cet état.

Si malgré tout ces moyens l'asthme et le germe
la maladie continue à faire des progrès par conséquent la
dissipation s'augmente et s'augmente, ainsi il y a, alors
la maladie se termine par cancer & à d par
Skirre d'agueres ou cancer illece ou illece
cancerous — calmans, narcotiques, et ainsi que les
maladies est mortelle on peut en parler très
... Loin la dose et l'usage

il a suffi par l'extirpation de la tumeur et l'extirpation de la tumeur
d'opium qui a donné 12 grammes. Et quelques
mois après on a pu par la suite du temps, si on ne peut l'extirper
par ce moyen contre la maladie il y a plus de ressources
La maladie ne prend plus d'extension qu'à un degré très avancé
cette terminaison des tumeurs se rencontre chez les sujets
chez lesquels la maladie a été trop avancée et chez ceux qui
sont affectés de la tumeur inflammatoire.

il y a 18 mois qu'un jeune homme avait un chancre
à la verge qui fut traité par l'usage de la saignée et de
procipite rouge, on le traita ensuite avec l'huile d'olive
puis avec le nitrate d'argent fondue. L'ulcère était cancéreux
il y avait engorgement dans le tissu cellulaire environnant... l'ulcère
était douloureux saignant... il y avait engorgement dans les
glandes... Delays de suppuration, narcotiques, les bains ont été
les bains locaux d'opium, les bains opiacés, la malade a été avec
la digitale... anctionation de l'ulcère... dans 12 mois et demi
l'ulcère cancéreux se trouvait guéri la maladie avait cessé. il avait
communiqué avec sa femme deux ou trois fois, on il avait le
chancre, on il l'avait eue de sa femme. cette femme n'avait point
de signe de maladie vénérienne et n'avait point voulu
prendre de médicament... cependant son mari revint
quelques temps après avec un bubon indolent commençant
fistuleux, boursoufflé, douloureux, on lui avait recommandé
de recevoir dans quelques jours il l'aurait passé deux mois
après, qu'on avait traité la malade tout à fait, on l'avait
de l'ulcère au bout de cet ulcère douloureux sans inflammation
et volumineux. M^r Cullerier l'eut alors l'extirpation
et que c'était la suite de la même maladie. il fit donc cesser
de traiter tout général que local, il employa les mêmes
moyens que dans la même maladie, mais ils furent insuffisants
Le (guirre) était déjà évident il était douloureux ou plutôt
cancéreux occulte. L'ulcère se guérit et le malade mourut
il croyait qu'il était guéri et qu'il était de sa femme
la mort du malade mais il avait un tout de sa femme
venir le trouver plutôt, car malade qu'il y avait sans

Dételle chez lui une disposition cancéreuse. Cependant on ne
aurait pas le croire d'abord que les douleurs cancéreuses aient
manifesté de bons bubons.

Tumeurs aux aisselles... il y en a quelquefois des exemples
après 12 maleds, qui ont traité en ville et on est dans que en
ont. Pour lui dans il se transporta le prépuce. La cicatrice
est ulcérée du côté du filet et il y a en un ulcère au pite
duquel sort venant deux bubons à l'aisselle... et 10 jours après
un des femmes, car l'ulcération aux parties génitales, n'aurait pas
pris la forme de chancre vénérien, c'est une maladie —
non seulement guérie quoique l'individu dise que l'ulcération
de son filet a tenu à la contagion c. d. de la masturbation — cet
homme venait de se séparer de sa femme ~~et~~.

Ces bubons axillaires sont quelquefois indolents, mais
le plus souvent inflammatoires, après s'être guéris ils
sont primitifs pour autant qu'ils sont guéris localement
mais au bout de quel paraissent peu de temps après les —
contagieuses ou peu de temps après ceux qui paraissent
dans l'endroit où la contagion a été prise.

Les bubons inguinés avec fluctuation d'écoulement
au bout de 12 heures, il fin est développé aux aisselles
c'est bien par métastase. Dans d'autres circonstances
les bubons axillaires sont consécutifs ou tant qu'ils
paraissent seulement après que les lymphatiques primitifs
ont guéri et ont été guéris primitivement.

Mais quelquefois les écoulements dans cette région
sont indépendants de la vérole. Le virus d'artère développe
souvent la tumeur cellulaire et les glandes axillaires.

Chez les femmes, d'origine de l'épistémie il a —
vues tumeurs aux glandes de cette partie sans qu'on
puisse en accuser la maladie vénérienne.

une femme entre autres de 35 ans en
18 mois avait des tumeurs aux parties qui suppurèrent
et cela s'est répété pendant 3 ans sans y comprendre des

2 par semestres quand l'ulcère sur le bras joint de
l'ulcère il y a 4 ans il s'est suppuré des purgations, s'est suppuré
un an et demi sur le bras qu'on a porté pendant deux ans
de foyes de la tumeur avait été détruit par les pustules
fondues.

il est assez difficile dans certains cas de savoir si ces
tumeurs sont ou ne sont pas veinéennes. signes communs
concomitt. utiles même traitement que pour ceux de
cancer.

Le plus est fort rarement par suppuration (et les foyes
est lentement rempli) peu par Résolution pour par induration
dans ce cas voy. 661 ans ains pour le traitement

quant à la suppuration quand le foyer est formé
on peut ouvrir de 2 manières... mais ici la suppuration
fait que la tumeur fait que l'acutition du pus se fait avec
facilité. les foyes se réunissent rapidement pour former
si cela n'arrivait pas Corps de l'ulcère. si l'ulcère
composé de peau amincie pot. fondue... mais grande
circumflexion à cause des vaisseaux plus superficiels de
qu'on ains. ^{au reste} il est rare qu'on soit obligé d'employer
aucun de ces moyens.

on peut les ulcères avec le digestif; inutile la suite
avec la dissolution opiacée, avec le sang de bœuf.
on les guérit avec assez d'attention de purgation, quelques fois
il y a une déviation pour la négligence du traitement
parce qu'on aura brulé le bras en accablant les bras
pour penser la plaie et alors la cicatrisation sera
retardée quand beaucoup de peau sera tendue et
elle abandonnera le point du foyer alors il faut mieux
éloigner la peau pour penser en accablant mieux le bras.
avec cette précaution on guérit facilement. cependant
il reste quelques fois des fistules... un peu de charpie
le soir dans pour éloigner le bras du trou
on avait un foyer.

suffisent... un jeune carabini était dans ce cas les fistules
a guéri d'elle-même =

Les tumeurs du col ou les bubons cervicaux
sont plus fréquents que les précédents. ils ont lieu tantôt dans
une partie plutôt dans une autre aussi: tantôt au-dessus
de la mâchoire; du menton tantôt par rapport à la latéralité
du côté dans le trajet de vaisseaux jugulaires. Il est rare
qu'il y ait une seule tumeur ou bien ~~peu de tumeurs~~
si elle est seule il y a engorgement dans les glandes
environnantes.

quand ces bubons sont purement vénériens il
n'y a qu'une tumeur et un léger engorgement dans les
glandes environnantes... quand il y a complication alors
il y a une collection de plusieurs glandes engorgées qui sont
quelquefois limitées dans une partie qui d'autres fois
sont plus bornées et qui, d'autres fois, se portent vers la
glande thyroïdienne et souvent celle-ci est envahie
~~(par le virus)~~
pour des varolides / gurretes... quelquefois il n'y a que
scrophules mais le plus souvent les tumeurs sont unies
c'est-à-dire, qui commencent par être vénériennes, elles se
complicitent de scrophules d'affection d'artérios et quelquefois
de virus particuliers inconnus.

Dans certains cas comme quand il y a une
tumeur vénérienne cervicale par métastase il n'est
guère douloureux quelquefois vénérienne aussi qu'après qu'il
y a eu des suppurations des chancre, des bubons &c.
mais il provient des tumeurs sans qu'il y ait eu de suppu-
ration à la maladie vénérienne. il provient de engorgement
à la suite de transpiration supprimée.

mais supposons qu'une tumeur ait été combattue
par des anti-vénériens... si elle persiste c'est une tumeur
vénérienne d'abord qui s'est compliquée d'une autre
cause qui a entraîné cet engorgement.

si on a donc la certitude que la maladie n'est pas
 il faut la traiter simplement comme telle. Si elle est
 indolente on vit en la traitant d'une manière
 convenable... si elle est unie au commencement par
 le traitement anti-inflammatoire on combattra
 l'engorgement dont la tumeur n'est pas connue au
 bon qui est scrophuleux, si la tumeur est connue
 par la coupe de la tumeur on emploiera les fondans
 si elle est unie. traitement combiné, si elle est
 d'autre nature délayans &c.

Si les glandes deviennent dures & dures, il faut
 abandonner la maladie à elle-même &c.

De même si la tumeur est scrophuleuse, il ne
 faut pas trop insister sur le traitement mais faire comme
 on fait dans les scrophules de l'enfant aisé: bon air, bon
 aliment, exercice &c.

Quant les glandes sont bien unies, qu'il y a de
 tumeur, il faut obtenir la dissolution de
 ces tumeurs ou bien faire dissoudre les glandes.

un perruquier portait à l'école portant
 plusieurs glandes engorgées, depuis la clavicle jusqu'à
 l'aisselle. Il y en avait une 12^e. elles suppurèrent et
 formèrent un trou à l'aisselle... on de l'huile, l'huile de
 faire une injection avec une forte dissolution de
 potasse caustique dans tout le trajet scrophuleux. Les glandes
 furent portées au plus haut degré avec délire, il se
 fit le point de périr pendant 24 heures. L'infammation
 fut si développée dans la région des tumeurs que
 tout fut rempli de pus depuis la clavicle jusqu'à
 l'aisselle. Cependant les charmes tombèrent les glandes tombèrent
 facilement &c. et la maladie accéda guéri. Il n'y eut une
 cicatrice extrêmement large et profonde mais
 le sang des crachats vint. C'est ce qui fut heureux on
 ne se composa ce qu'il y avait de pus ordinaire
 dans une petite manœuvre à ce coup de jet qui
 dit on a guéri un malade qui avait un foyer

De puis d ans le poitrine

Lors que les glandes furent détachées, séparées par les ligaments
il eurent fait l'opération quand le premier remède
est détruit. ce qui peut se faire quand les glandes ne sont
pas trop nombreuses, sont superficielles, ou bien quand la
tumeur est volumineuse, diffuse et que le malade
ne peut pas avec elle se présenter au public...

M.^r Cullerius a fait de pareilles excisions et
même d'autres très grandes, très profondes.

un malade à bitète avait des tumeurs (cervicales)
qui se propageaient jusqu'au niveau de la clavicle
c'est à dire, la tumeur s'ensuivait, se repartait jusqu'à la
clavicle. Les deux tumeurs réunies auraient eu le
volume de la tête. Et le malade n'aurait pas l'apparence
d'avoir eu jamais la Maladie vénérienne. incision
de 9 à 10 pouces depuis l'oreille jusqu'à la clavicle
et les glandes furent enlevées dans des aréoles, avant des
profondeurs d'un pouce. il y eut des tumeurs au-dessous une
autre cavité qui fut aussi enlevée. quand les
cicatrices furent faites de ce côté, les mêmes opérations
furent répétées au côté opposé. Les glandes étaient très
moyennes, de la grosseur d'un œuf de pigeon
il y en avait comme 20, ou 25.

Il y avait une glande près de la prostate, et une autre
qui était très grande et à large base. il la disséqua
parce qu'il n'y avait pas de gros vaisseaux ^{art.} qui la
traversaient. il donna des veins jugulaires internes
seulement dedans. — au bout de 8 à 10 jours cet homme
qui souffrait très bien trouva que quelque chose de
douloureux. et il mourut en effet. Le malade
et le médecin de garde lui avait dit qu'il avait couru des
grands dangers et que si l'opération n'avait pas
eu lieu, il aurait été mort. il le pria de cet homme
autour d'un mal sans doute, il crut que le danger
était encore présent. — L'artère carotide

avoir été mis à découvert 2 ans, 6 & 8 lignes. plusieurs
autres, étaient enfoncés, dans la ligature ainsi toutes des faibles
faibles.

Plusieurs fois on a cru avoir enlevé des glandes
parotides, mais c'est sans doute sans qu'il n'y ait enlevé
deux cauches de glandes... sans y toucher. mais ce qui se
peut passer c'est à cette opinion. C'est que la glande
parotide est accompagnée de plusieurs glandes lymphatiques.
quant au lieu il n'y a de découverte de glandes parotides
allongées à peine sensible, affaiblies par des autres
glandes qui les couvrent et cependant elles atteignent
complètement. il y a peut-être l'apparence d'autres que
l'extirpation de semblables glandes, long ans traversées dans
deux parties profonde par l'artère carotide par la raison
de cela la faire fois et a pu servir de grand secours.

il survient divers, tumeurs, récurrentes, sur
les différentes parties du corps
un malade a eu deux tumeurs qui se sont
mises de la cuisse qui se rapprochant de l'os. ces
maladies sont assez difficiles à distinguer de celles qui
sont récurrentes... siques, communs. Cependant, mais si elles se
trouvent sur des personnes traitées antérieurement de mala-
des récurrentes. le cas est douteux et il n'y a que les
traitements qui puissent faire sentir de l'efficacité... mais
peu plus de sûreté on peut s'en avoir recours.

Si elles sont sur des parties molles, elles sont très dangereuses
si elles correspondent à des parties, ou des os ou sont par
bien recouvert de parties molles comme les tumeurs de la tête
de la cuisse des articulations & alors il est à craindre que
l'os ne soit atteint.

il y a des tumeurs de la tête les articulations sont
la nature est semblable à du foin de du miel & s
mais qu'on porte la nature de la couleur de la peau? Le
traitement est le même. quand les tumeurs sont

formées, il s'agit d'examiner si y a fluctuation
 et dans ce cas si le pus est aminci... si elle n'est
 pas le point de l'ouverture il y a eu abandon des
 foyes de la nature... -- si y a indolence on fait usage
 des emplâtres, foudans et quand d'inflammation est
 produite des amollisseurs pour les tumeurs d'acuité

Mais quand les maladies est subordonnée
 complication de caries font il ouvrir le tumeur
 Les auteurs ont prétendu qu'il fallait l'abandonner
 au travail de la nature parce qu'on a craint que
 dans le frappant les parties caries ne rendit le mal
 plus graves... D'autres auteurs prétendent qu'il faut ouvrir
 la tumeur parce que la carie a été occasionnée par
 le séjour du pus sur elle et peut s'élever encore
 cependant la carie est quelquefois les causes de
 la tumeur alors il faut quelquefois d'urgence
 de mettre les à découvert et il faut lui laisser
 le temps de séparer les parties mortes de la partie
 vivante.

Il n'y a point de diathèse scurbutique
 prophylactique et autre qui produise l'ulcère. alors
 il n'est pas de mauvais caractères. Dans des
 cas contraires la suppuration est lente & alors
 car contraire la suppuration est lente & alors
 il faut plusieurs mois au bout d'un an ou deux
 d'après la guérison; la chose est difficile surtout
 dans les maladies récurrentes est ancienne
 chez ceux d'entre les malades récurrents est ancienne
 chez des sujets affaiblis encore plus pour ceux qui
 ont des complications scurbutiques &c. cette
 tumeur peut dégénérer en tumeur scurbutique
 en fistule en cancer &c.

il se forme aussi des tumeurs apoplectiques
 sur des articulations. tumeurs qui ont reçu
 divers noms, quelquefois les articulations

font volumineux et semble qu'il y ait une brèche dans les
nodosités

quelques fois ces tumeurs sont même une matière
blanchâtre semblable au pus, tumeurs tuffeuses
quelques fois semblable à de la gomme délayée ou les
appelées gommeuses, gummoseuses, gommoseuses. on
ordinairement elles se trouvent aux membres supérieurs
quelques fois aux inférieurs

deux grands points d'observation, pour la malade
récidive peut ordinairement il y a complication avec
le rhumatisme ou goutte même. Il est difficile
de distinguer si le tumeur est la goutte ou si la
maladie récurrente. Sûr Commem. & examinés si
y a une maladie récurrente - si elle a été bien traitée
si elle a disparu trop promptement - si elle n'est
une complication avec l'affection rhumatismale
goutteuse dans le cours de la maladie récurrente &c.

S'il y a des nodosités, par qu'il y ait une apparence
de maladie récurrente. Si ces nodosités ne sont pas
constants, c'est-à-dire si elles disparaissent de temps en
temps si elles sont accompagnées de rougeur si y a
ou aux parties environnantes &c. alors elles ne dépendent
pas de la maladie récurrente. alors on ne donnera
pas l'ant-rhumatisme qui développent les douleurs de
l'irritation. mais dans les cas de doute on peut
employer des sudorifiques, puis que c'est un moyen
curatif contre les maladies arthritiques

Les tumeurs existent depuis un certain
temps lorsqu'elle contiennent cette espèce de pus, il est
bien plus difficile de les guérir. On ne peut les
faire partir d'où il est rare qu'elles se terminent par
absorption ou suppuration & même au moyen de la
ou reconnaissance de nature, cependant il paraît
encore plus facile en supposant tout ce qui

Si on passe de savoirs s'il y a des douleurs récurrentes que pour le nudus, nous fite la maladie porte une tumeur aux articulations, depuis longtemps et il y a eu des douleurs périodiques, avec les tumeurs s'il y a eu inflammation momentanée, si des symptômes récurrents existent, il ont été combattus d'une manière convenable... alors il n'y a pas de probabilité de récidive de la maladie récurrente... mais si n'y a pas eu d'intermission dans la douleur si elle est toujours été la même si n'y a pas eu de récessus avec récessus continués à certains temps &c. alors il y a presque certitude qu'il y a une maladie récurrente c'est-à-dire.

quelquefois ces tumeurs sont extrêmement gênantes empêchant des mouvements des doigts ou de la flexion surtout, forment saillie au point où se trouvent les articulations au dos, du bassin cellulaire qui forme la tumeur &c. alors les symptômes récurrents combattus il ne faudrait pas abandonner la maladie, il faudrait faire une incision sur la tumeur en évitant les veines lesquelles contraindraient les mouvements. et ne risquent pas d'être sans danger.

Les gommeuses ont lieu surtout aux articulations du poignet quelquefois à celle du pied avec la faiblesse. la matière qui les forme ressemble à de la gomme diluée mais très épaisse elle est d'un jaune foncé et une consistance de pâte elle est contenue ordinairement dans une kiste c'est-à-dire que la tumeur comprimée dans la matière ressemble alors à un ligament ou une corde, les tumeurs sont un symptôme consécutif.

de la maladie cancéreuse ^{Courme les autres} ~~anciennes~~ elle, viennent
ordinairement chez ceux qui sont depuis longtemps infir-
mes. Et il a vu plusieurs malades qui en étaient atteints
La tumeur qu'on y a faite à la base interne des
poignets... une

une jeune avait une tumeur ^{appelée} comme une ampoule,
de poêle, suppurative... au début tous douleurs ostéocopes,
elles ne prit que des tumeurs fongiques... des symptômes
de la maladie cancéreuse. Des parureites Les gonumites ont été
d'abord diminué de moitié quand l'inflammation fut
suppurée et au lieu de la terminer par absorption
comme elle avait d'abord fait ruiner des vaisseaux de la base
elle suppure, d'abord à la base, puis de la base et était
une matière blanche épaisse comme du lait qui
était du pus... ~~La~~ La part qui s'écoulait était
fluente filante et ressemblait à de la gomme délayée
épaisse grislative. Le kiste avait une fistule de
injections. Il y forma de nouveau de la suppuration
introduction de l'oboch trochique de plomb qui y
appela l'inflammation... a long agglutination des
parois du kiste cellulaire... calcification. Cette
tumeur était cancéreuse, mais quelquefois les
tumeurs gonumites ont été cancéreuses... Le kiste
suppure de la membrane qui contient la gomme
ces tumeurs proviennent de l'écroulement... il sera
facile de les distinguer d'après les signes communs. et l'on
cependant si ces tumeurs existent depuis un
certain temps si elles ont bien pu des malades
qui ont des affections cancéreuses (notamment
sans doute) alors le cas est douteux, beaucoup de
tumeurs que les modes les gonumites & sont rares.

Ossements qui se rencontrent dans les parties pures ou exostoses.

Le mot exostose est un mot général qui indique le développement des os, cependant on ne les conserve que pour celui des os plats ou celui qui survient au corps des os longs. Quant ce n'est que dans le parosote des os qui forment le développement et dans le perioste on l'appelle periostose.

Tous les os peuvent se développer par un vice véritable, cependant les os plats et les os longs y sont plus exposés. Presque toujours les exostoses ont lieu au tibia. Dans le crâne rarement. on en trouve au radius, au cubitus surtout, à l'humérus quelquefois. Quant aux os de la tête, c'est assez fréquent ainsi qu'au sternum. Il est rare qu'il soit alors la seule partie affectée et que les parties molles qui recouvrent et os n'y soient pour rien.

On a divisé les exostoses en superficielles et en profondes.

- 1^o superficielles quand la surface de l'os est seulement développée.
- 2^o en profondes quand il y a un développement joint dans les deux humeurs particulières.
- 3^o en exostoses circonscrites quand l'ostéome est arrondi. on a peu vu de ces formes courbes.
- 4^o en exost. inégales irégulières (sans doute) quand elles sont inégalement développées.
- 5^o en externes
- 6^o en internes ce sont celles qui se développent à l'intérieur ou dans les os formés sur la table interne des os plats ou dans le cavité des os longs, ainsi. Il y a par exemple développement à la face interne de la clavicule ou du sternum.

mais qu'il y en ait encore il y a exostose intermédiaire la
histologie de la viéne... il en a vu des exemples en fait
que les pressants de l'acervissement ~~une~~ exostose forme
seulement tumeur pure et simple quand il y a que
développement
mais des ostéoclastes peut être décelés... il y a
plusieurs espèces de complications, ~~indéterminées~~ est seulement
à l'os ou bien elle s'étend aux parties molles... il y a des
exostoses dans les quels l'ostéoclaste n'est qu'un des derniers
quelques fois les tumeurs sont mixtes quoiqu'il y ait caries.

Il y a des causes d'exostose indépendantes du vice
vénérien. ces causes sont externes quand un corps
agissant sur la os les invite à s'enflammer. y
appelle un plus grand développement. une chute un coup
peuvent produire des effets qui finissent une exostose
vénérienne... il en a vu de cette espèce sur le tibia.

Des vices Complicques quelquefois la maladie venant
dans des exostoses... un autre voit de fréquemment scorbutiques
occasionnés par un développement excessif mais les signes qui
les distinguent des vénériennes, sont faciles à saisir
dans les exostoses vénériennes il y aura au des signes
primaires & ou bien il n'y aura rien de qui se trouve
dans le vice scorbutique ~~peu~~ ce n'est seulement qu'un
3^e degré de scorbut qui se trouve dans des exostoses
scorbutiques voy. scorbut.

Les exostoses paraissent être scorbutiques on les reconnaît
aux signes qui sont caractéristiques cette maladie... les font
héréditaires dans son enfance & persistent les signes de
scorbutique & des développement excessif & donc qu'il n'y a
lément aux os.

Dans les & vice Concrètes du développement excessif
soit au massé cela arrive quelquefois dans la maladie
vénérienne d'artère, mais de signes positifs lui prouve
à distinguer. Les tumeurs se développent à mesure
que la maladie s'accroît et dans la maladie
vénérienne quand le développement est arrêté

un certain degré il s'arrête. Dans l'escrotofe caecale
la douleur sera continue & viendra de suite s'allouer
par fécades. Le tumeur entoure le pifin cellulaire
parthoient de l'engorgement dont les est attaquée. ...
dans la maladie vénérienne les principes d'abord
la nuit que la douleur se fait sentir. de est grande
il est rare qu'elle empêche le jour la tumeur soit
ordinairement et les des mers ne sont pas altérés.
Il n'est pas car on les en très embarrasés.

en voici un exemple.

une fille de 12 ans portait des escrotofes qui étaient
venues par gradation sa mère se portait bien traitant anti-ven
les tumeurs n'ont pas diminué ni font pas devenues douloureuses
point de fièvre ni de scrophules lui fait se portait bien
d'ailleurs point de d'arthre calcareuse il y a 18 mois qu'il
n'en pour la 1^{re} fois. elle avait un ulcère en forme de
pustule entre les attaches de muscles sternum-mastitien-escro-
tofe de la poitrine. des tumeurs à la jambe gauche
des cloppement dans le radius. à son fort aduise d'ans
l'hôpital. 6 ans sudorifiques, mercuriaux - dans les 6 semaines
ciment il a cru que la maladie allait guérir l'ulcère
la poitrine fut en effet cicatrisé dans 4 semaines. -
celui de la poitrine se dégorgea la carie se résolut il y eut
cicatrice. Les tumeurs avaient un peu perdu de leur
volume. ~~Après~~ ^{Après} après, un certain temps de stagnation
des tumeurs elles se font irritées d'abord par des bouillottes
et après l'usage des évacuans des douces on obtient encore
de ~~diminuer~~ ^{perdre} perdre de leur volume. ~~de~~ ^{ne} ne sont pas alté-
rés font irritées une 3^e tumeur fort manifeste à la
jambe gauche. La des cloppement du radius a
deglacé en escrotofe. Les tumeurs se font survenues -
aux jambes surtout qu'il y a 4 escrotofes ulcérées
en outre il arrive des tumeurs considérables aux
membres supérieurs = Il a été entrepris le
traitement anti-vénérien parce qu'il a eu
plusieurs fois de la maladie qui semblait avoir
la maladie vénérienne par pifin exposé de lui

gagner, & qui s'aggravent par les anti-Vénériens.
 mais ici le temps est peu vénérien. c'est un état morbifique
 dont la nature ne peut être fautive.

Le Prinquiste par le oxotops doit varier suivant les
 aspects. quand on s'en est acquis une grande simplicité
 ordinairement la guérison en est prompte. quand elle est
 ancienne, quelle qu'elle soit en quelque sorte en oxotops
 et quand il y a complication de la maladie. & fâcheuse très
 longue &c.

Le traitement consiste dans le mercure associé avec
 les pidoriques. L'emploi de ces deux demanderait
 tant de temps à moins que les mercures n'aient déjà été administrés
 très à l'usage pidoriques très-forte très rapprochés de la tumeur.

Le traitement doit varier suivant les aspects.

Il y a des oxotops avec une grande tumeur des pidoriques avec
 douleur mais qui sont susceptibles. elle dépend de la
 distension des pidoriques intérieurement par la tumeur offensée. relâchant
 cette tumeur avec des compresses trempées dans des liquides de
 même nature &c. ... quand les oxotops sont profondes
 les émissions sont utiles encore en ce qu'elles peuvent porter
 leur action sur les nerfs qui vont se rendre dans les os
 mais il faut de moyens puissants pour endormir les
 tumeurs en quelque sorte. calmant marot d'icy, forte
 détachement de parot de morve. extrait de gomme d'opium.

quand les douleurs qui compliquent les oxotops sont
 vénériennes on peut les combattre par les moyens employés
 contre les douleurs vénériennes. C'est, les anti-Vénériens appliqués
 sur la tumeur, on a conseillé l'onguent appliqué ad
 desu & au-dessous de la tumeur et par les os on a
 vu des tumeurs très-douloireuses guéries comme par
 enchantement. mais toujours ce moyen ne réussit
 pas. il semble qu'il ne parvienne pas jusqu'au mal.
 on a proposé le mercure sublimé d'une manière
 ou les qu'il est plus actif, c. a. d. en vapeurs. c'est
 ainsi qu'autrefois on employait avec succès les
 fumigations c. a. d. qu'on se faisait brûler avec
 le sulfre cinabre, on a vu plusieurs fois des
 tumeurs refractaires aux frictions & d'ici avec

Saillie au merveux no vapeurs, incas, il faut seulement
que les parties affectées ne soit touchées et ne pas perdre
trop long la purgation.

Certains anciens la servaient d'une forte decoction
de salse parille de gaine... les autres, disaient qu'il fallait
les decoctions de salse. C'est-à-dire, il fallait au sang
saler pour le faire purifier. C'est-à-dire, qu'il y a
les exostose: il la employe sans sucre: il y a apparence
qu'une forte decoction conviendrait mieux.

Chargée de proyeus à la malade, dure depuis
longtemps il y a ulcération, si elle n'est que superficielle
aux atteignants de virus ou les font d'ailleurs, au combattant
l'inflammation des teguments ou les cause et ulcération
d'origine. Cette complication est peu importante.

Si l'ulcération est dans l'épaisseur même de l'exostose
est avec altération de la cavité alors la maladie —
Les plus grandes difficultés pour la guérison. Complète, quelque
fois il faut un an entier. mais pour traiter la guérison
on peut se servir de fer rouge.

Lorsque ces complications de l'exostose ont été
détruites, il ne faut pas croire que la maladie soit terminée
ou aura bien fait d'ailleurs de volumes mais il n'est
pas plus possible de détruire une tumeur osseuse bien
organisée que de détruire une cal. Cependant quand
l'exostose est récente, qu'il y a une inflammation dans la
dureté et qu'il y a encore inflammation dans la
partie que les os ne sont pas encore organisés, exostose
si l'on peut aussi dire; alors on peut diminuer la
tumeur quelquefois en entier. quelquefois la consist-
ence n'est pas grande que l'exostose prend la forme d'os
elle est extrêmement dure. il n'est possible qu'un
seul exemple.

mais supposons qu'il y ait maladie venérienne avec fistule au
qu'il y ait carie. a longuette. Des caries malades, appartenant au-t-
tousjours d'un ou combattre d'abord la vie s'écouler que. une
roy. possible par la dent.

La carie n'est possible que par la carie venérienne seulement par-
laissu malade. La prognostic est favorable, si l'en-dan,
une partie profonde il est vivif. Si elle existe depuis
longtemps, si elle se rapproche de la racine. La maladie est
difficile à guérir. encore plus si l'est incertain quelle soit
venérienne ou quelle dépende d'un principe in connu...

Le traitement général comme pour l'ex.
Le traitement local doit varier suivant l'état des
dents de la carie.

Les maladies est elle simple? souvent de propriétés pour
éloigner les corps certains qui pourraient parvenir, injectés
plus ou moins la per, de la. fiers dans les intervalles, &
si la carie est plus profondément fixée si elle n'est pas
possible à la vue injectés, encore & on a proposé
de l'application de résine de calcaol. aussi les tentes
de mèche et de l'oil. ces résines ou substances d'histoire
Beauvais, celui du Commandeur, le Beauvais est de mèche
d'Al. tenons à fait de l'expérience. dont il résulte que
calcaol et les résines forment une espèce de plaque un
empêche l'absorption irritant de parties et qu'avec
les malades. Les injections les moyens de propagation
obtiennent une exfoliation plus prompte. toutes les di-
quant tout d'un tiers et quelquefois de la moitié d'un
tiers, qui ballait pour servir avec calcaol et résines
de l'oil & on a fait proposer de très bons perforateurs
et exfoliateurs. La résine venant ratifier = mèche. mèche.

Mais si la carie est par venérienne il faut changer
l'organisation de la partie inférieure. carie. il est rare que
malgré toutes les attentions possibles, les caries qui sont
ne produisent quelques accid. ont aussi on a vu recourir au
perforateur pour la carie venérienne ou venue mais pour
cela il faut que la maladie ne soit pas si avancée trop
profondément.

à bientôt vers une homme avait une carie
très considérable à la mèche. il y a appliqué la fen-
dans toute son étendue. Le dentaire tomba bientôt.

Les vaisseaux qui portent de la lymphe et qui appliqués auvez & froids
et alors dilatare & extender la lymphe qui porte de la
Consistance de la vie. L'ulcère devient humide et les
Cicatrices se font. il y a 17 ans de cela dernière
il a examiné cette jambe elle est très saine mais il
reste toujours un gonflement à l'extrémité inférieure
de la jambe. il avoit que ces choses se font par tout
de la lymphe lymphatique car le frottement appliqué par tout
l'ulcère et il a développé la jambe au bout de 10. des cicatrices
lymphatiques qui sont dures et dures dures dures dures dures
de la destruction de la lymphe et du tissu cellulaire. et
le plus ou soit une espèce de substance (ou) d'infirmité
et si Consistance que plusieurs fois le malade a reçu de
chocs sur la Cicatrice pour quelle se soit convertie en
ainsi que la nature fait d'elle de, muni de défense
à nos parties. (Poursuivi) mais à découvrir chez
un homme. Goutteux de cette nature visible, et si

traitement pour la carie interne, c. a. d. celle qui attaque le
la portion des qui sont aux cavités ou bien les parties correspondantes
à la cavité articulaire.
qui présente cette altération. ne peut.

La douleur en est le seul signe mais la douleur peut être
occasionnée par une excroissance par un état particulier de la
membrane de la moelle &c.

Il y a d'autre moyen que de perforez les os pour donner
issue à la portion ulcérée et ainsi il faudrait en voir avec
des signes positifs. il n'y a pas de même si la carie
se voit dans quelques cavités c. a. d. qu'on voit un os qui se
ainsi lorsqu'on voit la carie attaquée la table interne de
l'os on peut établir un foyer de suppuration qui vient
à se prononcer à l'extérieur pourvu que l'on ait eu soin de
la table externe sicut &c. il n'y a que des os de la
tête.

ou on s'oppose que la carie des os spongieux n'est plus
difficile à guérir que dans les os durs et pourvu
qu'on s'oppose de propre soins de guérir cependant
il y a bien des exceptions, à cette règle pour
vu que l'on s'oppose de propre soins de guérir cependant

transposant il a vu les os spongieux attaqués
de carie se détacher et guérir plus promptement

pleurose ou mort de l'org. pour les distiques de
 La corie ou gangrène humide; ou l'appelle encore gangrène
 sèche.
 on a fait différentes classes de caries
 quand elle attaque qu'un table de os plats ou que la superficie
 de os longs & on d'Agrippa est de la corie osseuse
 on dit que c'est de la corie quand elle attaque le des table
 de os plats ou toute l'étendue de os longs, mais une dans
 de la corie quand de la attaque dans toute l'étendue de
 en longue soit en profondeur ou la corie est
 de la corie quand elle attaque une distique ou une

La corie tant au osseuse ou au osseuse qui par une irritation
 trop forte y a été le osseuse
 la production de médicaments trop actifs pour y être trop
 les peuvent causer la distique
 quelquefois la corie se fait à la suite de la
 maladie osseuse... à l'inter les gangrènes
 des tumeurs spongieuses de tumeurs de osseuse
 une incision sur la partie de osseuse de osseuse
 très bien quand il y a des osseuses (c'est un
 conseil 300 faveurs de osseuses)
 chaque si violent qu'il a osseuses
 dans première de osseuses il n'est osseuses

quelquefois les médicaments ou mal ou
 intempérément adonnés peuvent produire la corie.
 une jeune fille osseuses à tout traites par les frictions
 comme les traitements était bas osseuses aussi lot que les symptômes
 de osseuses de osseuses de osseuses de osseuses de osseuses
 son état... elle était osseuses de osseuses de osseuses
 et l'inflammation osseuses de osseuses de osseuses
 que les distiques osseuses de osseuses de osseuses
 calmèrent mais les maladies qui ne pouvait ramener les
 machines osseuses un jour osseuses de osseuses de osseuses
 machines osseuses de osseuses de osseuses de osseuses
 se separa sous la corie de osseuses de osseuses de osseuses

il est divers degrés dans le Douleur, deux degrés sont le
nom du Douleur de perforation &c.
quand les Douleurs occupent des régions lombaires il est
rare qu'elles dépendent de la maladie des reins. Lombago

Douleurs sciatiques... elles arrivent au 24 degré du
scorbut... dans les perforations de fices neal âge général. Les douleurs
est grave et tantôt dans un endroit tantôt dans un autre.
tantôt elles est générale. La complication sciatique quel
est évidente... quelquefois cependant les douleurs a fond au
24 degré... mais encore il est facile de reconnaître le scorbut
au changement de couleur à la peau au développement
des veines &c. Les douleurs sciatiques d'ailleurs sont et les

des douleurs rhumatismales, se font sentir tantôt
dans une partie dans une autre et principalement dans la
Membre... elles ne sont pas constantes dans le même endroit
C. a d. elles existent pas toujours... ainsi quand
le tour des artères finit on trouve, quand on se propose
à une cause quelconque qui diminue quand elle, existent
elles se renouvellent ou bien font quand elle,
dès qu'elles disparaissent. Elles existent d'intensité quand on
disparaissent ou diminue et restent au dit.
s'approche du fice ou quand on reste au dit.

il est une douleur qui se fixe dans le nerf
sciatique et on l'appelle sciatique grave qu'elle se
trouve dans la direction du nerf qui porte le nom.
il y a des douleurs arthritiques, une goutteuse, elle
est dans les articulations, dans les membranes des ligaments
des parties molles existant... mais ces douleurs n'existent
que pendant un certain temps, elles finissent comme
elles font venues par gradations.

il y a des douleurs qui se portent le long
de la colonne vertébrale... lombago de l'agitation
des excès rénaux... La diminution de la transpiration
toute dans les perforations, exposées aux causes qui
produisent cet effet 900 &c. au point la cause
de plus les perforations qui sont courbes dans
leurs occupations... Mais indépendamment
de ces causes il est des perforations qui n'opposent

chaque jour les douleurs jusqu'à que les parties qui ont
sont le siège sont chauffées par le travail.
D'autres en ont comme si c'était une affection
goutteuse.

Les douleurs ont lieu dans des parties profondes dans
les os d'ailleurs douleurs ostéocopes. Les os sont froids quand
les parties sont chauffées par une chaleur artificielle (comme
les feux ou par une chaleur naturelle comme quand on est dans
le lit et les os dissipent pendant la journée et durant
la nuit qu'on soit ou qu'on ne soit point couché.

Longtemps il a cru ^{autrefois} que les douleurs ostéocopes n'avaient
les malades, debout toute la nuit avoir des douleurs à une
certaine époque du soir. Malgré qu'il ne fût point
posé exposé à une variation de température. ...
Cependant quoiqu'on ne puisse pas découvrir que
ces douleurs sont plus intenses lorsqu'on est couché
chauffé que lorsqu'on est à une température
ordinaire on le voit.

Un individu qui a servi à cette expérience
avait les douleurs depuis 10 heures du soir jusqu'à
12 heures aller diminueait jusqu'à 4 du matin
à 5 ou à 6 heures il cessait tout à fait de lui-même...
après 12 heures il recommençait à diminuer
insensiblement jusqu'à 6 de manière qu'il était
supportable... Il a répété plusieurs fois la même
expérience... cessait à 4 ou 5 heures. Des
douleurs n'empêchent point ^{les} mouvements
des membres, elles ne sont ni dans les muscles ni
dans le tissu cellulaire. Mais sont fixes dans les parties
profondes des membres, et n'attaquent pas les
parties molles. Elles se font sentir plus grandement
l'état de chaleur du corps que pendant le froid
30. Ces douleurs pendant la nuit qu'on voit passer
et sont suspendues pendant le jour; elles ont
des heures fixes et pour leur commencement
et pour leur terminaison.

être dans les complications de douleurs sont extrêmement
 difficile de distinguer celles qui dépendent de l'une et de
 l'autre maladie. alors la difficulté est grande pour
 établir la ligne de démarcation de la douleur dépendant
 de telle ou telle maladie... mais il faut faire usage
 des médicaments qui doivent nécessairement
 détruire l'une de ces douleurs... ainsi quand la
 douleur rhumatismale est compliquée de virus
 véreux on voit advenir ces deux, anti-véreux
 et la douleur qui dépend de la dernière affection
 sera guérie bientôt... cependant on peut
 dans ce cas combiner les médicaments de manière
 que les deux douleurs soient détruites... ainsi le
 purgatif drastique de l'antonique, qui en même temps
 dans les maladies rhumatismales, et la mercuriale
 est si efficace dans les affect. véreuses, peuvent
 être administrés en même temps.

quand on est sûr de la existence de
 l'affection véreuse il ne faut plus donner de
 médicaments qui la combattent parce qu'on
 pourrait en retirer pour la douleur rhumatismale
 et pour recourir à celle-ci on aura recours à

les 2^{es} figures qui la caractérisent
 et de même il ne faut pas insister sur les
 médicaments quand on voit que les douleurs
 rhumatismales résistent, et alors on ne peut
 pas guérir cette maladie, on entre que
 momentanément, tandis que la douleur
 véreuse cesse complètement et pour
 toujours on ne peut guérir véreux. de la
 2^{es} friction elle est souvent cessé.

Il est des exceptions pour les douleurs
 rhumatismales, on a dit qu'il
 se fait souvent principalement sentir dans les
 muscles et cela est vrai, mais n'est

jeune médecin a été au moins deux ans douloureux rhumatis-
males dans toute les parties... il se forma une tumeur
indolente dans les glandes de cou tant quelle d'un point d'affecton
rhumatismales... l'ulcère se détacha l'écaille... les
douloureux rhumatismales reparurent... en douloureux...
est-ce que en quelque parties venant à effacer de...
pouvoit en est affecté... et quand les parties se
trouvaient dégagées les testicules, prennent des volumes
d'inflammation par conséquent... et lors plus de temps
plus de gêne dans la respiration... Le malade se porte-
bien d'ailleurs... l'engorgement diminue, mais en-
semble les douloureux rhumatismales, se portent
à la tête et ne le quittent que pour se faire
des muscles intercostaux... mais les testicules se gonflent
de nouveau et tout... ne reste aucun
symptôme précédents. Irritation du testicule qui
détourne l'inflammation qui se termine par une
suppuration cutanée... La maladie ne en est sou-
lagée dans le testicule et apparemment que si-
l'ulcère est ancien se dissipe il y aura une autre
partie qui se trouvera affectée par le rhumatisme.

D'ailleurs que le rhumatisme se porte sur les os
la chose est évidente... il a éprouvé il y a quelques
années, un rhumatisme qui lui a parcouru tout
le corps... il commença par un engorgement aux
genoux qui acquit par les 4. 5. 6. son volume
ordinaire... qui le força de rester trois semaines
au lit... il se dissipa alors et il resta en ar-
rêts, en être attaqué... le rhumatisme se porta
alors, tantôt au crâne... tantôt à
l'inférieure, et il y a trois ans qu'il se porta à
la région frontale dont les bosses furent
développées de manière qu'elle ressemblaient
à des exostoses... il y avait un battant
considérable et un travail continuel pendant

2 semaines... le rhumatisme en disperse avec l'écologie
 il l'a éprouvé. Encore depuis mais c'est peu de chose ap-
 paremment qu'il n'est affaibli par le moyen d'une fièvre
 tierce qu'il a eu d'année dernière... Dans les fonges de ces
 on ne peut pas pour les fonges. Commémoratifs et concon-
 mitaux pour éclaircir sur la nature de la maladie.
 quand il y a complication variéenne ou double
 des mercuriels, si surtout ceux-ci avec la syphilis... dans
 une course de jours les docteurs vénériens se dissipent si
 chez les vénériens et font les chasser près des portes de
 la peur... et lais-^{se} les font scabieuses, il ne faut
 les faire usage des mercuriels ^{voy. combat.}
 il y avait au milieu du 16^e siècle un symptôme
 très fréquent de la maladie vénérienne c'était la
 pelade... ou altération de la peau sans
 ulcère... quand il y avait d'affection que les chaudières
 on donnait cette maladie.

Les auteurs qui ont écrit ensuite en ont parlé
 comme d'un symptôme commun... on prétend que
 c'est celui qu'on doit ~~de~~ l'usage des
 hercules... c'était sans doute le premier et vénérien
 porté sur la bulbe de cheval qui occasionnait cette
 altération qui se suspendait la circulation dans
 les poils et les cheveux, ceux-ci finissaient à se dessécher
 puis ils se viciaient. Le traitement
 ancien était celui d'antivénérien. Le traitement
 local a varié suivant les auteurs. Les uns faisaient
 des applications locales, d'autres celles de la gomme
 de la gomme de blaireau, d'autres celle de nouveau
 de l'huile de poisson mais toutes ces ne pouvaient
 empêcher la chute... il voit un ou
 deux malades pour une attaque de cette
 maladie et, mais il n'en a vu que de trois.

• Les ongles ou pelades, ne sont-elles que partielles. Il est certain
 cependant qu'elles peuvent devenir complètes sans la destruction
 du trichement local est inutile mais pour empêcher
 qu'ils ne tombent tout à fait il faut couper ce qui
 en reste... par là il faut moins de précautions pour les
 renouir et quand ils sont courts et alors qu'ils ne la racine
 soit attaquée on empêche que la circulation soit compromise
 sur toute la peau des cheveux, ensuite on la coupe pour
 parce qu'il y a beaucoup de petits cheveux de poids qui
 sont intercalés entre les cheveux qui ne croissent pas
 mais qui prennent de la consistance quand on les coupe
 et qui pèsent et se développent alors de manière
 à devenir des cheveux... de là vient qu'on à l'air
 d'augmenter les cheveux sur les coupants, pourtant mais
 c'est parce qu'on augmente le volume des petits poils
 et qu'on leur donne assez de consistance pour
 prendre la forme de cheveux.

Le croûtement la maladie est très-rare quelquefois il
 passe des années entières sans en venir.
 Il est dû de même de long temps avant de celle qui consiste
 dans l'ulcération de la base des ongles, mais de celle où les
 ongles sont frappés de mort. La circulation vasculaire
 n'est plus. L'ongle est pâle, humide et il est d'un blanc
 tirant sur le brun, il n'adhère plus au point où venait
 quelquefois les ongles tombent spontanément, quelquefois
 on est obligé de couper jusqu'à la partie vivante
 originelle et alors il se forme une ongle d'forme inégale
 parce qu'on n'a pas de moule pour ainsi dire pour
 le contenir et alors le développement n'est pas
 circonscrit dans des limites exactes.

Dans l'ongle arraché il y a quelques jours
 à une semaine (voir) il y avait des bords tranchants
 qui lui ont fait croire que l'arrachement en

avait été parfait. Il croyait que la maladie allait se
guérir... un nouvel ougla a reparu mais nous organises
et sang vie mais séparés des parties vivantes. Il y a une petite
indolence; sur un corps étranger puis que l'ulcère s'est agrandi
sans la présence.

Les ouglades qui sont sans ulcération sont
sans danger. Le traitement est le même que
celui des maladies conjonctives et guérit instantanément
local. Il en a été parlé.

Mais des ulcères des ouglades ou il y a ulcère s'appellent
ouglades d'auvergne. - et on appelle ouglades sans addition
d'aphtose quand les ouglades sont sans altération sans que il
y ait solution de continuité de la muqueuse. alors les
ouglades perdent leur vie tombant quelquefois de même
et quelquefois on est obligé de les arracher.

Partement d'oreilles. on a commencé à en parler
depuis la milieu du 16^e siècle. Les chirurgiens
symplomes de la maladie sont les mêmes. il a lieu
fréquemment, mais ce n'est qu'un accident de la maladie
presque toujours quand il y a ulcère au pharynx ou voile
palatin et la tumeur est totale de la tumeur d'oreille
ou même une brèche quelquefois semblable au
tintement d'oreille des quelques fois au bruit de la
tambour ce qui annonce une altération de la
dissipation dans l'organisation de la tumeur
d'oreille. Les, ne suffisent pas les, dissipa-
tions nécessaires on passe par ces états,
produit par tous ces bruits d'oreille... infirmité
qu'il y a des maladies qui antérieurement au crâne
entraînent dans un état de bruit de tambour et d'
un autre que celui d'une clochette.

Il faut traiter les ulcères de la bouche
sans avoir égard instantanément d'oreille qui se
dissipent à moins que le désordre de l'oreille n'inté-
resse deux des organes qui produisent le
tintement ou bruit complet de l'oreille.

une femme vint au Palais Royal de veuve de son
voisin, les cavités nasales; elle est presque fondue de saignée.
du bruit extraordinaire qu'elle entendait et qui variait suivant
les modifications de l'air. On ne put s'empêcher de
brûler d'oreilles mais on le fit d'un mal qu'on des-
cendait. Le déglutition se fait avec bien mais
elle ne saurait distinguer les sons sans le moyen.
C. Epilepsie Vénérienne.

Les auteurs en citent plusieurs exemples. sur une 20^e de
M. Malade, il n'en a vu que deux exemples.

Le 1^{er} Hospital de l'épilepsie vénérienne est présenté
à Bicêtre en 1788. il était âgé de 30 et quelques années,
avait eu ci-devant plusieurs fois des symptômes de
Maladie Vénérienne tels que gonorrhées, chancres &c.
qui n'avaient été traités que palliativement avec quelques
applications locales, quelques médicaments intérieurs qu'on
lui avait administrés, avaient été toujours discontinués
à la fin de la disparition des symptômes. à la suite
de la suite de la disparition d'un chancre il
éprouva une commotion d'épilepsie. D'abord les
accès de connaissance ne furent point complets. Le
second accès fut plus fort, car il y eut perte totale
de connaissance, il survint 7 ou 8 accès, les uns
suivants. ^{15 ou 20 jours} et à l'issue de ces accès les malades véné-
riels produisent cette affection. ni chagrin
ni remède de crainte ou de surprise &c.
deux jours après son entrée il éprouva un accès im-
portant que les précédents. cependant le traitement
était commencé. il eut vers le 7^e ou 8^e frictions
un mal-aise ~~une fièvre~~ affective malade -
générale mais qui était plutôt un spasme
de poitrine ~~un spasme~~ de chagrin et de

Monophtes qu'une acie épiloptique. Le Malade resta
encore à l'hôpital pendant environ 5 ans rien
éprouver. il est dans les reins jésus la fois de
89 sans éprouver de récidive. Mais comme après
M^r. Culbertson fort malade et qu'il est homme ne
put lui parler de jésus ne lui plus 2 ou 3 jours
la révolution vint être faite.

il y a deux ans qu'un homme se presenta devant
la consultation de la gratuite de l'école de médecine
dont il est membre. il avait tous les huit jours
des acies épiloptiques portés au plus haut degré. il avait
des tremblements de la partie gauche de la face du côté
et des membres supérieurs. certains lui avait on donné
amphacat aut le vericorne la prison de l'opificat
plus il allait au devant plus les acies se
deviennent intenses. il interrogea le malade. il
convint qu'il avait eu beaucoup de maladies vené-
reuses bubons &c. il s'était traité lui-même
quelque fois. Les symptômes avaient des paroxysmes
différents, éparqués. cependant il n'y avait que
probabilité qu'il y eût eu Maladies vené-
reuses. Les paroxysmes n'avaient pas eu depuis l'opificat. il n'y
avait que 18 mois qu'il l'avait lui-même.
nulle cause efficiente n'y avait donné lieu. on
le décida à entrer à l'hôpital... 2 jours après
acies épiloptiques de plus forte intensité.
Conduits de tout le corps de la bouche partie des
connaissances se l'indica. ~~par~~ $\frac{1}{3}$ d'heure pour
le moins et de plus tant de tous pores qu'il
se dissipait tout instant... sudorifique et
Mucate par voie. — infusion de tilleul.
il devait éprouver une 2^e attaque 8 jours
après la 1^{re}. elle eut lieu mais insuffi-
sant faible et de courte durée. Le 3^e acies

mais qui devint purulent ne fut autre chose que ce
 taudium vite qu'on remarque lors de l'incubation des
 virus syphilit. Depuis cette époque il a fait trois fois
 de séjour dans l'hôpital sans rien éprouver. il
 avait autre chose de maux de tumeurs menagées de-
 voiraillement qui étaient plus fortes quand les Malades
 étaient sur le point d'être atteints d'un accès. il ne
 les éprouvait qu'après la diète, et accablé fit se couchait
 il ne souffrait pas de douleurs. C'est croyant que c'était
 causé par un dérangement de la tumeur = cela fut
 dissipé = ~~l'individue~~ Ce l'individue horloger des profess.
 ou puellier, est venu depuis de voir plusieurs fois
 parce qu'il avait été atteint, d'un revivre après, et que
 de symptômes de Maladie vénérienne se manifestèrent
 chez lui et pour cause.

Gonorrhée Maladie contagieuse qui attaque
 le canal de l'urètre. elle excite différents vices. les
 anciens croyaient que c'était un écoulement de matière
 féminale. Comme elle est affectée souvent accompagnée
 de douleurs on l'appelle chaude-pisse. ^{parce qu'il y a} écoulement
 avec chaleur; elle est appelée gonorrhée lorsque ayant un
 déchirement superficiel des vaisseaux de la membrane
 est avec une légère perte de sang; gonorrhée quand
 il y a qu'un simple écoulement de sang.
 La venue d'écoulement urétral. naviculaires
 fessiers vaginal ^{ou} peuvent se faire...
~~est~~ est quelquefois même matière qui est fournie
 par des pores cachés entre le prépuce et le gland
 a été prise pour un écoulement de l'urètre.
 quelquefois il vient de la matrice... une
 blanchisseuse avait gagné de son insu la
 Maladie vénérienne qu'elle avait apportée
 son mari. Comme elle l'eut négligée la

il y eut descente de matrice... on eut dit au 1^{er} aspect
 qu'il étoit une hernie phrénitide et c'est par suite de
 de semblable accident qu'on a autrefois attribué...
 chez cette femme le vagin parait développé et la matrice
 il étoit dans comme les autres 3^e ans: il y a clairement
 que la matrice de l'enfant venait de la matrice
 Le canal de l'urètre de femme, les est finement le
 siège... certains auteurs ont prétendu (et il y en a encore
 qui le pensent) que les écoulements quand ils sont vermineux
 chez la femme ~~se passent~~ ^{se passent} toujours dans
 l'urètre et cependant ceux qui ont leur siège dans
 le vagin sont les plus nombreux; ils sont même
 alors plus contagieux pour les hommes, ~~parce qu'ils~~
 glissent que ceux pour lesquels si facilement y a pas de
 il faut effrayer cette partie la comprimée 3^e.

Dans l'un et l'autre sexe l'un peut fournir
 un écoulement provenant d'une infection plus abondante
 de microbes et qui quand l'infestation s'est élevée
 de la partie malade ~~peut~~ ^{peut} est jointe à une matrice
 purulente... cela arrive quelquefois à la suite de
 introductions insolites = il y a 18 mois qu'une fille a
 accompli ~~accompli~~ ^{accompli} elle est devenue d'une bonne foi
 de la cause de la maladie.

Le Nombil = il n'a lieu que dans ceux qui put très enfoncé,
des oreilles, il est conséquent... cependant on ne peut répondre
 de rien, il y a des cas, si singuliers.

Je ne puis alors chez les enfants nouveaux nés
 parce qu'ils ont les yeux appliqués contre les orifices de la
 nez et infestés. L'écoulement en est semblable à celui
 des parties inférieures, il est conséquent chez les
 enfants, s'il partait par les yeux par exemple, après
 avoir arrosé par d'abord sur les parties génitales.
 L'ophtalmie et étiologique est toujours consen-

tière à moins... la matière est de la même qualité que celle qui sort de l'utérus. même nature, même ^{en} quantité, même couleur, même consistance... y aurait il transport de la matière de l'écoulement utérin au vagin, non sans doute mais sans doute par une circulation semblable. Si ~~voilà~~ ^{voilà} le secret.

il peut y avoir des écoulements consécutifs par les fosses - vaginales quoiqu'il n'en ait jamais vu.

Les écoulements primitifs viennent dans l'espace d'un mois ~~après la contagion~~ ^{après} c'est le 3^e jour après, après fréquemment 5 à 8 jours, rarement après 15 jours, plus rarement encore à un mois. il en a vu quelques exemples.

il y en a de consécutifs on en a vu venir à la suite de bubons qui se dissipent, de même qu'on a vu des écoulements prodromes de bubons quand les poils se font, on a vu aussi l'écoulement avoir lieu par le développement d'un bubon.

on a distingué les ^{écoulements} en malins et en benignes

Les écoulements inflammatoires sont avec douleur et inflammation... cependant une écoulement peut être inflammatoire sans qu'il détermine beaucoup de douleur comme aussi il peut être douloureux sans beaucoup de inflammation.

Dans les premiers cas on n'est guère que quand les urines passent que la douleur se fait sentir à l'utérus... mais de l'eau suive en prodromes, et que quand l'écoulement a lieu or, quand une partie est inflammée elle se porte par action à l'action que dans l'état ordinaire... et il y a une espèce de combat entre le corps capereux et le canal de l'utérus qui ne peut obéir à son action. quand la douleur prédomine sur l'inflammation, alors cette douleur se fait sentir dans tous les lieux.

Les gonorrhées sont envoie distinguées en - habituelle et en intermittente.

Les 1^{re} est celle qui s'arrête quelques semaines, quelques - mois pour reparaître ensuite.

est toujours par un vice du canal par

un retournement on per un point d'indication
qui n'est pas contagieuse mais dépend d'un autre ^{cause}

elle est simple ou compliquée... aussi diverses ^{ou}
et en même temps.

Si on la considère comme gagnée par le coït on
ne voit qu'incertitudes sur l'époque de son apparition.

Catena (c'est d'une) une lèvre qui avait son siège dans
le commencement des canals de l'urètre... elle comme
elle prouvait bien même que le produit d'un chancre
ou d'un lieu de pénétration qu'il n'avait intention de
parler que de ces symptômes d'autant plus qu'il n'en a
plus été question plus qu'à propos d'écoulements
d'écoulements gonorrhéiques avec beaucoup de développement
et qui les bien classés. Il dit que c'est un écoulement
gagné par le coït ^{et} il le décrit comme symptôme
de la maladie vénérienne.

mais comme maladie contagieuse résisterait
elle que depuis cette époque?

Dans le levitique on trouve qu'il y avait d'
cette époque une maladie contagieuse gagnée par le coït
quand on en était atteint on était obligé de se séquestrer
de la société de faire de ~~plusieurs~~ abstinences ~~de~~
il paraît que la maladie ~~résistait~~ durait que 8 jours.

on dit que les maladies vénériennes ont été
l'objet de l'attention des européens g. hardin écossais
parle d'une maladie dans laquelle les chancres et les
douleurs de la verge se feraient remarquer durant le
passage de l'urine c'était le signe d'un point de contact
entre les deux sexes... le traitement d'il était avec
douleur de brûlures. on trouve dans quelques vieilles
pharmacies de 1440 des médicaments contre les
écoulements du canal de l'urètre... de rasage
faits à l'urètre et à l'anus la même année
de fonder de recevoir dans les hospices des hommes

ou de femme, qui portaient des écoulements de sang.

Différentes causes peuvent produire les écoulements ~~terre~~
des écoulements, de cause externe sont affectés, Multipliés.

Dans les deux sexes, des causes très différentes, une éjaculation
trop répétée, le quitte sans cesse le, perforce, qui n'y sont
pas habitués, par la compression du balancement du co-
canal de l'urètre, d'une secretion plus abondante du mucus
qui quelquefois est atténué et se rapproche de la surface
du pus, l'insertion dans le corps et saugé dans le
canal, comme la sonde qui alors produit d'abord un
écoulement muqueux qui ensuite devient d'un blanc terne
qui termine ensuite par la femme vend et qui a toutes
les apparences de celui qui est le produit de la fonte,
le cathétérisme... un malade avait beaucoup de médicaments
pour lequel il avait fait usage de beaucoup de médicaments
il s'était livré avec rage à la masturbation il en
était venu au point que ne pouvant passer la cathétérisme
ordinaire, appelé borgeuse dans les parties, il introduisait
dans le canal un corps arrondi comme une sonde et

un autre se servant d'un morceau de plomb qu'il
attachait avec un fil et auquel il avait donné une forme
arrondie qui présentait de petits quarts... afin d'entretenir la force
initiale pour les au canal les ondules les mouvements
peristaltiques, dit des... Le fil s'était cassé, on avait essayé
et le plomb s'était introduit dans la vessie... on
avait essayé de fonder le plomb dans la vessie... mais
les moyens employés n'ayant pu y parvenir...
dubois lui fit l'opération de la taille.

Certains boissous peuvent produire l'écoulement
il en est, perforce, par exemple qui ne peuvent boire
de la bière forte sans avoir un écoulement... mais
il n'est que momentanée à moins qu'elle n'en fasse

usage habituel... pour l'arrêter ou pour faire
proprement il suffit de boire après un verre d'eau de
P. et un verre d'urine... ^{pour le faire} ^{pour le faire}

Les retentings valent mieux d'urine... ^{qui ne sont pas}
 parce qu'ils retentissent d'urine... Il y a une inflammation de la
 vessie et de l'urètre... et souvent pendant 3 semaines
 suivent des coliques. ont des écoulements perloins
 quand la pierre fœtale présente au Col de la vessie.
 il arrive souvent aux enfans à l'époque de la dentition,
 aux filles au moment de la menstruation jus qu'à ce
 qu'elle soit établie et persiste quelquefois après
 certaines vices le produisent comme le dartre
 Le rhumatisme al gr^{de} écoulements contagieux se glissent
 t. 16 c. 10 p. 11

Le rhumatisme

Mais il y a des écoulements contagieux se déclarant
relativement à tel individu ou partie de ce point
des écoulements relatifs est à dire qu'une femme
qui n'a point eu le virus peut donner au son mari
un écoulement contagieux pour que d'autre qui coïtent
avec cette même femme négroissent avec elle et
inconséquemment ces deux exemples -
hummer agent trahit son ami ou jouit

un jeune homme ayant traité son ami au journal
de la mort elle était âgée de 19 ans bien portante et très-faible
d'ailleurs, ce qui ne le dispense pas d'une blennorrhagie douloureuse
inflammatoire, il ne pouvait attribuer son mal à aucune
autre cause, puisqu'il n'en avait point vu depuis deux mois
apparemment l'eau de caudeuse n'avait rien pris après, de la
maîtresse ni avant ni après qu'elle ait couché avec les
gonorrhées. on ne pouvait pas dire qu'il avait eu l'habitude
d'être pas après la coque des gonorrhées puisqu'il
avait déjà eu un traitement pour un pareil
symptôme par le docteur, puis de M. Cellarius lui-même
La petite maîtresse ayant été comparée devant
le professeur on lui trouva sur elle aucun trace
de maladie vénérienne elle n'avait qu'un écoulement
blanc ordinaire chez elle femme. cependant les
jeunes hommes peu contents de ces recherches, voulant
les pousser plus loin et pour cela il leur vint des
idées de coiffeur de après avoir coiffé sans aucun
le frère Coiffeur lui même en procurant les jours
de la maîtresse commune à un autre jeune

la

ies

il

m

p

abla

tue

dia

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Le bubon récuriens Le nom de bubon a été pris de l'endroit de la partie ou est ordinairement le siège de cette tumeur. Bâdon, inguen, arros quoique le bubon soit ordinairement situé dans cette partie il le trouve quelquefois ailleurs, on a aussi donné à cette tumeur le nom très-grolier de poulain, expression mise en vogue par étienne lecoq chirurgien de paris parce qu'il étoit abstrus que le denuché de ce qu'il en étoit affecté, étoit guérie, il a cru y trouver de la ressemblance avec celle d'un poulain qui n'a pas encore l'allure de ses père et mère.

Le bubon a été très-probablement un symptôme de la maladie récurienne seulement quelque temps après son apparition, celle à paris anguleuse a fixé l'attention des auteurs, au siége de nasarre en 1495 un auteur dit bien en avoir vu certains apparemment qu'ils étoient produits par une autre cause de sonis finis en 1497 ne les considérait pas comme récuriens car il disait que c'étoit la crise des maladies pestilentielle affectées communes à cette époque. Les auteurs qui en ont ensuite fait mention tel que Jean de vigo qui a parlé de plusieurs symptomes dont on se étoit pas encore occupé, n'en disent rien, mais lui-même quoiqu'il en parle ne s'en explique pas de manière à ce qu'on puisse les regarder comme un symptôme de la maladie récurienne cependant la n'est pas une preuve qu'il n'existe pas alors car frascator ne voyait pas beaucoup de récuriens après 1536 nicolas maffes le décrit très-bien et dit qu'il y a toujours présente par comme nouveau de manière qu'il y a toujours du doute et de l'incertitude sur l'époque ou ces symptomes a commencé. nicolas maffes explique même la formation du bubon qui vient se développer de la région de la foie ou soit en faire l'ouverture pour en déterminer la supuration, parce que dit-il la foie laime et le mouvement de la foie, quelques auteurs tiennent encore à ce préjugé et de ces maladies de voir qu'on fasse l'ouverture de leurs bubons.

Les bubons récuriens occupent ordinairement laime, la tumeur a lieu dans le tissu cellulaire le plus souvent il commence par les glandes lymphatiques qui se gonflent et le tissu cellulaire n'est affecté que consécutivement dans ce cas la tumeur forme une masse arrondie qui par le développement de l'inflammation ne fait plus qu'une même chose et qui par une consistance générale est transformée.

Le siège des bubons est dans laime tantôt au dessus tantôt au dessous presque toujours dans le tissu cellulaire qu'on les glandes. cependant il en a vu d'autres qui étoient situés non seulement hors de l'endroit ou sont les glandes lymphatiques inguinales, mais quelquefois même à la hauteur de l'ombilic d'autres à la partie inférieure en les même distance et souvent ils avoient des es même turs qu'il y en avoit aux aines. Des auteurs prétendent en avoir vu aux grandes lèvres, mais apparemment que ce n'étoit qu'une inflammation des grandes lèvres, mais si on rejette les bubons dans la classe générale des bubons phlegmones, alors il y en auroit dans toutes les parties du corps.

après la région de laime celle où ces tumeurs se développent le plus fréquemment est la région cervicale. Ces tumeurs sont souvent la suite des tumeurs inguinales, qui se sont terminées par dilatescence. tantôt c'est à la partie inférieure tantôt à la moyenne mais le plus ordinairement à la supérieure, qu'elles se montrent. quelquefois elles forment un chapelet une espèce de cascade qui va d'une oreille à l'autre quelquefois il y a une simple tumeur quelquefois aussi il y en a 5 ou 6 qui se suivent les uns des autres, ~~ou~~ ces engorgemens sont rarement des tumeurs purement vénériennes, mais sont compliqués du vice scrophuleux le mal est d'abord vénérien il dégénère ensuite en scrophuleux, ou en développé le principe antérieurement caché, ou non encore développé dans le malade. cette complication retarde singulièrement la ~~voie~~ de la guérison de la maladie. quelquefois une année n'est de traitement est pas suffisante.

Les glandes axillaires en sont fréquemment le siège les bubons sont quelquefois primitifs lorsque au col ici ils surviennent à la suite d'un bubeon de laime terminés par dilatescence ordinairement ils marchent avec plus de rapidité ont une terminaison plus franche que ceux du col et il est rare qu'ils présentent plus de difficulté que ceux de laime il en a vu dext grand à terminer par

induration mais est très-rare au lieu qu'est la terminaison les
plus communes de celles du col
est la cellulite y a sur toute la tumeur phlegmonneuse
qui ne diffèrent des bubons qu'en ce qu'elle vient assés dans des glandes
et peut être vly à tel point même de parties où il ne s'en trouve point.

La cause des bubons est manifeste... mais les tumeurs peuvent
avoir lieu à l'aine par différentes causes d'abord il arrive assez
fréquemment depuis 12 jusqu'à 16 ans des engorgemens lymphatiques
dans l'aine qu'on a appelle tumeurs de croissance. serait-ce parce que
l'âge puberté s'approche et qu'à cause de cela il y a empêche-
ment de circulation.

un jeune homme avait montré à son père un
semblable engorgement qui le gênait dans la marche. Le père
de l'adolescent de l'avis qu'il était vénérien ne douta pas que son
fils n'eût la vérole parce qu'il avait eue d'expérience pour
l'avoir quel étaient les symptômes. il fit appeler le médecin
la tumeur ressembloit beaucoup à un bubon vénérien il était
arrondi et assez développé, mais il n'avait pas le caractère d'une
tumeur inflammatoire (la peau n'était que légèrement
rouge, elle n'avait point de chaleur et il n'y avait
qu'une douleur de tension résultant du pissement de la peau.
Le jeune homme déclara depuis ne s'être exposé à aucun danger
il s'engagea à rester tranquille et annonça que la maladie
se dissiperait sous cependant en être certain parce qu'il
y a des bubons aigus & au bout de quelque temps de repos
dans une position horizontale les tumeurs disparaissent.

une autre cause peut au improprement être les
défauts de descente du testicule dans les bourses quelquefois
il reste dans le tissu cellulaire et forme une tumeur sensible
pres que douloureuse au toucher semblable à celle occasionnée
dans le virus vénérien. mais pour la distinguer des
celle dernière il suffit de palper les bourses et si
il manque un testicule puis la nature de la douleur la
sensibilité vive de la partie. Lorsqu'on la presse & tout
bien différents du précédent. aussi est il bien plus facile
de connaître la nature de la tumeur que dans le cas où
il n'y a que la tumeur.

quelquefois il survient des engorgemens assez volumineux produits par absorption si les engelures aux pieds ne sont pas soignées si la supuration en est absorbée, alors peut agir sur les glandes lymphatiques, et y produire des engorgemens ce qui lui est arrivé en 1783. et cela doit s'entendre aussi de tout ulcère des pieds, des jambes, etc. Cuius et de toutes les parties situées au dessous de l'aine.

quelquefois il se forme des tumeurs par congestion qui ont le même caractère que les bubons quelquefois douloureux, quelquefois indolents et qui font plus ou moins de saillie suivant la position ou se tient le malade et en avons plusieurs exemples dans l'hôpital mais en touchant les tumeurs et en interrogeant le malade on ne peut avoir plus de doute... les tumeurs ou paraissent légèrement à l'aine et être accompagnées de fluctuations douloureuses de gêne dans l'organe à presser. La tumeur est plus considérable quand l'homme est debout que quand il est couché. &c.

quelquefois il vient des tumeurs à l'aine qui sont intimes ainsi dans la peste ces bubons on se distingue des vénériens que par les symptômes concomitans. de même dans les maladies adynamiques quoiqu'on les voit ordinairement les paratites qui sont affectées.

quelquefois il se développe une tumeur lipomateuse dans le tissu cellulaire de l'aine de laquelle on voit un homme avait à l'aine une tumeur qui avait toute l'apparence d'un bubon vénérien de plus il avait des excoriations sur le gland qui paraissaient et disparaissaient alternativement. plusieurs regards cet homme comme atteint de la maladie vénérienne mais celui-ci lui ayant observé qu'il y avait de la saillie qu'il portait cette tumeur lui fit changer d'avis. C'est la tumeur est une véritable lipome mais était dure mais cédait à la compression (comme un paquet de graisse

93 Cependant au 1^{er} aspect elle avait disparu & venant quelques
quelques fois des hernies curables quand elles ne sont pas trop
bien développées, peuvent être prises pour un bubon vénérien
l'ab. ^{qui est un peu douloureux}

à l'hôtel dieu de nantes, une fille avait une tumeur à l'aîne ou plutôt
un cataplasme fœtal on administrait la liqueur de Waus-Witman. Le
chirurgien dit qu'il y avait fluctuation. Le bistouri y est enfoncé.
Intérieurement il a mis des médicaments locaux quelques jours après mort.

Il a vu au même hôpital deux tumeurs anévrysmales
ouentes par le bistouri parce qu'on les regardait comme des
pneumones ou des tumeurs inflammatoires. Les deux malades
mourent pubertés.

quand on prend un bubon pour une hernie
mais une tumeur ~~ou une~~ ^{ou une} hernie pour une tumeur
cependant on peut ~~faire~~ ^{faire} une tumeur phlegmonique et
enfin y appliquer un bandage comme cela est arrivé
souvent. plusieurs fois il a été arrivé à l'hôpital des
hommes atteints de la maladie vénérienne enveloppés dans
de grands bandages.

un homme avait un chancre et un bubon à l'aîne
bandagiste lui dit que c'était une hernie il lui appliqua
dessus un bandage. comme il souffrait horriblement et qu'il
ne pouvait plus supporter l'appareil il revint chez le bandagiste
celui-ci lui dit que la matière de l'ulcération était absorbée
et avait produit la hernie, et que même l'aspiration
mercurielle pourrait le porter sur l'autre côté et y
détacher une seconde hernie pour les prévenir il
lui appliqua un double bandage. cet homme arriva
un beau matin à l'hôpital des capucins avec cet équipement
il ne lui avait coûté que 1 louis y compris de ses bandages.

il y a des différences entre le bubon et la hernie qui peuvent
les faire distinguer l'un de l'autre. Le lieu de leur situation
est le même dans les premiers la tumeur se prolonge
dans l'aîne et y a pour base de la tumeur se forme
graduellement d'ya douleur d'engorgement quand l'engorgement

Le tranchement a lieu. Dans les tubercules dans le, hémis, douloureux
 et y a collique souffrante on envie de vomir... Les douleurs
 sont plus locale dans le bubon est une douleur d'inflammation
 on sent dans les hémis on sent qu'il y ait de l'inflammation
 de la malade s'élève et ensuite de la tension et c'est tout le
 contraire dans le bubon qui a ailleurs les bases pour une partie
 solide & g.

Lorsque la maladie vénérienne est sur le point de paraître
 on sent ordinairement une fatigue une malaise toute particulière
 qui précède de 24 heures plus ou moins la manifestation. Dans
 la maladie, est le commencement de la période viciée on ne
 peut pas dire que c'est état d'inquiétude, tremblement de la crainte
 de la maladie puis que ceux mêmes qui n'ont pas leur des
 souffrances les femmes qui leur ont inoculé le virus éprouvent
 ce symptôme que beaucoup de malades lui ont présenté...
 cette remarque a lieu surtout pour le bubon... ensuite petit
 développement qui va tantôt rapidement tantôt d'autant
 moins que le bubon doit être inflammatoire ou indolent
 quelquefois après avoir fait de progrès assez rapides il reste
 stationnaire quelques jours pour reprendre ensuite son développe-
 ment avec beaucoup d'énergie aussi... 6... 8... jours
 entre son commencement et son état parvenu les périodes, c. à d.
 après 15 jours on peut caractériser le bubon inflammatoire
 ou indolent mais cet état peut changer de lui en l'autre...
 3. 4 sem. 4 milig.

Il y a des bubons avec durates de parties = bubons envenimés
 d'autres sont avec ulcères... - - - - - ulcères
 d'autres... avec fistule... - - - - - fistules
 d'autres sont douloureux & bords roussis... - - - - - Cancereux.
 supuration de mauvaise nature &... - - - - - Gangrene.
 d'autres sont avec gangrène... - - - - - Gangrene
 ou les, divisé encore en... - - - - - primitifs
 et en... - - - - - consécutifs

Les bubons primitifs paraissent ordinairement du 3^e
 au 20^e jours après l'inoculation de la maladie, une
 individu meurt en quelques 13 mois après le bubon

Après.
un espagnol avait gagné le gros lot à la loterie de Bordeaux
arrivé à Paris il fut bien surpris de se voir un tabon 6 mois après
avoir vu une bordata de. depuis il ne s'était occupé d'autre
travail, accompli avec aucun fume.

Le traitement est toujours le même pour les tabons
primaires, qu'ils paraissent plutôt ou plus tard après la coqueluche,
terminaison. Le tabon est une tumeur inflammatoire
terminaison, par suppuration, par induration, par dilatation,
il se termine par, supuration, par induration, par gangrène, par
par métastase par fluxion, par cancer, par gangrène, par

1^o par résolution c'est la terminaison de la tumeur dans laquelle
disparaissant peu à peu sans foyer de suppuration, il faut que
les vaisseaux réagissent sur les fluides qui distendent leurs parois
de manière que la circulation soit rétablie car la tumeur par
inflammation est formée par l'agrandissement des vaisseaux et
des foyers des liquides.

2^o par suppuration: il y a tabon inflammation suppurative collection
de pus soit par la destruction des tissus cellulaires soit par la
plus considérable des liquides. L'induration de la peau principale,
en est dans le tissu cellulaire. La suppuration peut
disparaître soit par dévotion des foyers soit par
absorption dans le premier cas, il se forme un ulcère.

3^o mais quelquefois la suppuration bien manifeste formée la
foyer bien tendue la fluctuation manifeste il y a
absorption du pus il en résulte dilatation cessant de
disparition du pus. L'absorption du pus est la détoxification
quand il rentre dans le torrent de la circulation mais
quand il y a eu absorption et de plus de pus de la matière
pu une autre peut être métastase = il y a des autres
qui peuvent que c'est une suppuration nouvelle.

La métastase n'est rare... il y a quelques années qu'une
fille eut une tumeur axillaire avec une fluctuation assez
évidente que elle qui se trouvait précédemment dans
l'aîne et cela dans l'espace de 36 heures.

Si la point d'irritation ou d'humeur est
portée dans un organe interneur alors la métastase
est extrêmement dangereuse tandis qu'elle en l'est guère

quand elle est extérieure

50 Le babouin ne se terminant ni par une résorption ni par
suppuration, & alors le fluide ne circulant pas les vaisseaux
tombent dans une espèce d'inaction ainsi que les liquides qui s'y
contenaient et de cette manière arrive l'induration. Si
le report des vaisseaux n'est pas encore fait, il s'est que
diminue il y a encore remède mais si cet état est
porté plus loin alors le babouin tombe à celui des fongues
et prend la figure d'un verfitet un certain temps qu'il
se développe de la chaleur & alors il passe à l'état Cancereux
quand il y a guérison... après... fongues... après plus
faible. 30 Cancer tout épuisé perdus il ne reste qu'à
enlever la partie.

6^e pour gangrène ordinairement est la suite d'une inflammation trop forte pour que la circulation puisse se faire et alors la partie est frappée de mort et tout ce qui en est frappé se détache. cette terminaison n'est pas ordinairement dangereuse. 2^e 2^e 2^e

quelques-uns cubons ^{et d'ulcères} ulcéreux gangreneux ^{et d'ulcères} et d'ulcères
quelques-uns est déjà ulcéré et très sale est étranger
à la nature de la tumeur et de l'inflammation est
une complication des ulcères généraux et une
terminaison de l'inflammation des cubons. C'est
une maladie grave dont le pronostic varie
selon les cas. y. pourrait s'échapper.

traitement des bubons primitifs... est-il récent - il
s'agit de foyers froids - inflammatoires ou infectieux -
dans la 1^{re} cas ou l'inflammation est modérée
ou elle est très forte... si elle est modérée on
peut traiter du frotte le bubon. Dans la cas contraire
il faut s'occuper des accidents plutôt que de la
maladie principale. ainsi l'hyphom, un bubon
inflammatoire ordinaire dans lequel les accidents ne
dominent pas la maladie principale alors on
peut administrer le traitement anti-vénérien
général. les fœbrifuges sont inutile ici les

97 billons incensibles. Le muricate de manure d'oyz ne font pas
apparaître ainsi il faut employer le muricate pur exigent
ou bien les frictions avec.

Le traitement des accidents de l'inflammation existant
dans les vairs les adouissants & couillous de veau petit lait
couillous d'herbes tisanes & graines de lin de graine de
lin.

" Pour traitemens local Topiques, relaxans, adoucisans cataplasmes
miez avec parties égales de farine de lies et de lies qui contiennent de
l'eau en état de chaleur et au princip a adoucisants.

mais quelquefois les cataplasmes peuvent suffire. On a vu des points
faisant quelquefois la peau est tendue et qu'on appelle des points
blancs dont le feu est entre la peau et l'épiderme, cela
tient souvent à ce qu'on a vu de la nature de la graine de la graine
de la peau, on a la nature de la graine de la graine qui peut
être avérée.

[illegible]

Le bubon parvenu à cet état où la peau est
aussinée que la pus est pur le point de sortie ou
nature fait effort pour se débarrasser de lui-même
d'où il en résulte une saignée ou la contusion
des os, d'incision et les symptômes se

l'ont à deux effets. L'incision
quand la tumeur est inflammatoire que les symptômes se
font soudains et de rapidité que le pus est raffermi en foyer
quand la peau n'est amincie qu'au centre que les
circulations se font bien dans la tumeur que les symptômes
n'augmentent avec régularité et uniformité il faut
abandonner l'ouverture à la nature. cette manière
de donner issue au pus est celle qui est la plus à
définir par la ou évite le danger; l'ouverture étant
petite la cicatrice n'est pas apparente il faut
donc la favoriser cette terminaison mais dans

Beaucoup de ces inflammations marche lentement ou
le peau s'aveugle dans tous les points, quand le peau
est d'un rouge foncé tirant un peu sur le bleu qu'il y a
de l'engorgement dans les parties environnantes, alors
l'ouverture faite le peau ne se recouvre pas et puleire -
on guérira par abandonner à lui même, dans lequel
cas il faut avant tout extirper appliquée une
caustique et la potasse caustique est préférable à tous
les autres, parce qu'elle agit efficacement et
promptement pour détruire le foyer... ainsi les
dons, le cas où le foyer est étendu, ou le bubon après
avoir mélangé avec promptitude ~~de la potasse caustique~~
diverses espièges irritables que la potasse couvrait
elle détruit toutes les parties de la peau sur lesquelles elle
est appliquée et il est bon de l'appliquer sur les parties
de la peau les plus amincies, il y a la même inflammation
accidentelle produite qui donne de la chaleur au
tissu cellulaire engorgé aux glandes et à la peau qui est
dans le voisinage et qui n'a pas encore été affectée
Lorsque la maladie a marché rapidement vers
la collection de pus quand le foyer n'est pas très étendu
quand la circulation le fait, que le contour de la
peau est dur rouge, etc. alors on peut ôter la
tumeur avec promptement tranchant. - la cicatrice qui
se résultera sera moins apparente avoir étendue qu'elle
produite par la caustique... il vaudra mieux faire
d'incision que d'abandonner l'ouverture à la nature
autrement il viendrait en apparence ou il ferait
nécessaire de faire usage de la potasse caustique
et arrive rarement qu'on guérisse et employer l'un ou l'autre
à l'hôpital parce que le malade n'y peut pas
après, raisonnablement pour rester tranquille 30

Règle générale, toutes les fois que la peau est
d'engorgement et se fait la douleur et trembler
des parties environnantes... supposez que la peau
se fera ouverte d'elle-même ou qu'elle aura été
ouverte trop tard si on traite ~~la tumeur~~ d'une manière
cette tumeur.

ordinaire alors l'apex ne peut pas se recoller avec le latif
 collé, alors il faut de l'autre quelquelquefois il
 faut de, années, avant que la cicatrisation s'opère; alors
 il faut se servir de caustiques ou de d'instrument
 touchant.

quand l'ouverture est petite ordinairement on se sert de
 caustiques... si on a pas beaucoup de peau à détacher si l'ouverture
 est petite on se sert de trochis qui fait avec le minimum on
 on de de plomb rouge en commençant par le plus mince des
 et par les on s'arrête un instant les peau en zigzag
 les parties jointes. les trochis qui appliqués ensemble
 suffisent dans certaines circonstances... d'autres fois plusieurs fois
 cela dépend de l'état du foyers.

Il est de cas où les bubons ne peuvent se cicatriser
 lorsque les teguments sont amollis de l'organe très
 largement qui l'ouverture est grande au lieu de caustiques
 on se sert plutôt de suture de suture à l'épave... pour
 détacher les communications les bandes étalées sur le ulcère, il est
 rare qu'on emploie les caustiques les trochis qui suffisent ordinairement
 ça bien on en fait description qui conviennent toujours quand
 de peau est déformée dans une grande étendue.

Il y a de cas dans lesquels les bubons ne peuvent se
 cicatriser parce que plus profondément par les glandes lymphatiques
 et quelquefois par les muscles et par des collections de pus qui forment
 des abscesses de laquiers... ainsi quand en pressant les parties on
 on fait sortir du pus qu'on y sent des parties plus
 résistantes qu'on sent et alors on est sûr qu'il y a des cliques
 et il faut alors des paraitre la complication ou cliquer
 il faut employer les caustiques et les mettre sur l'ulcère on
 il existe une fois ouvert l'ulcère l'ulcère guérit avec
 promptitude. si la cliquer était ouvert à la partie
 supérieure alors il y en faudrait pas venir de suite à la
 destruction des parties parce qu'alors on peut en venir à
 obtenir la réunion à cause que l'ouverture est à la partie
 la plus élevée quand on ne peut même parvenir à
 la réunion on est de injections avec la pommade
 de cendre et d'huile d'ail qui agissent comme dans
 l'opération de l'hydrocèle. si au contraire de cliquer
 est situé à la partie inférieure il est si rare que
 la réunion se fasse sans détacher que pour mille exemples
 on ne peut guère citer que deux ou trois.

hist. de trojel fistuleux est compliqué d'une carie os —
 L'ischioréale maladie devient de plus en plus grave il faut —
 détruire toutes les parties avoisinantes pour le guérir dans tous
 les retards et dans tous les cas. Mais si les fistules sont compliquées
 d'une carie os os du pubis ou des os branches montantes
 de l'ischion les choses ne pourraient se faire sans détruire les —
 vaisseaux & pour ce cas il faut abandonner les —
 maladies de la nature.

Il est d'autres maladies qui ont des fistules dont le foyer
 est dans le tisse cellulaire mais qui ont tout autres indices —
 sans leur trojel, il faut enlever les foyers & découvrir pour
 les incisions qui peuvent être nécessaires.

entre ces complications du bubon ulcéré il faut —
 la complication d'affection scrofuleuse &c.

Les bubons scrofuleux se compliquent d'engorgement des —
 glandes ou ces glandes sont encore organisées et —
 alors le nitrate d'argent suffira pour les réprimer ou —
 en fait la cautérisation avec le potasse fondue quand —
 il n'y a point de signe de cicatrisation prochaine. C'est à dire
 de petites granulations &c.

Quand les glandes sont fistuleuses isolées fistuleuses —
 superficiellement ~~donc~~ il convient d'enlever les glandes —
 pour que la guérison soit plus prompte. on fait des —
 glandes avec une encre à double branche ou les dispo-
 se en dedans et en dehors on porte le bistouri au-dessus & —
 on bien les glandes sont organisées mortes c. à d. & —
 qu'elles ne tombent pas encore en suppuration mais conservent —
 leur forme de glandes sans qu'il y ait de circulation alors —
 il faut faire des fortes compressions et alors on bien on accise —
 les glandes ou bien on les fait sortir. pour —
 parvenir à guérir prompt il faut que les glandes —
 soient peu volumineuses et fistuleuses superficiellement
 (on propose un calibre large et bien nature petites).

30)
il y a deux trois manières d'évacuer le pus des bubons
1.° Par abandonner l'ouverture de la tumeur à la nature c'est à dire
c'est à marcher rapidement que la partie centrale de la peau
seulement est altérée
2.° y appliquer la potasse florissante quand la tumeur a mûri
avec lenteur que la peau est légèrement sensible amincée
instrument tranchant quand l'inflammation a été
3.° employer l'instrument tranchant quand l'inflammation a été
rapide et que le bubon ne fove pas 3.° pour les chancres
tantôt par caut. tantôt trachis que de pleins rouge

Complications d'affect. d'anthrax
quand il y a une éruption d'anthrax sur les parties
environnantes, les ulcères, des bubons ouverts apparemment des
latéralement ou restent stationnaires quelquefois d'affect. d'anthrax
d'anthrax se porte sur le bubon lui-même dans ce cas il
faut admettre des parties employées à l'extérieur les délayés
et de l'encre, de l'espace, pour diminuer la respiration
des humeurs vicieuses, on peut pour d'anthrax point
d'irritation - ainsi d'oppression purgatif. 3.°
il faut laisser se diff. l'éruption d'anthrax avant que
de combattre les symptômes vénéreux.

Complications combattues.

elle est assez fréquente surtout d'hygiène, dans les faibles
plusieurs, chez les personnes qui habitent des lieux humides
ou qui usent d'une mauvaise nourriture 8.° il faut
dans cette complication ajoindre le traitement anti-vénérien
car les malades étant faibles nous ne pouvons pas
de se borner mais avoir pour le caust. qui y ont donné
avec l'ass. d'ailleurs dans l'usage et l'usage des urines
les anti-vénériens pourraient les nuire et à la
fin mort.

si l'ulcère du bubon est compliqué d'affect. d'anthrax
cancéreux il faut encore bien d'ailleurs pour
chasser les dispositions. si un bubon subit d'être
bien d'ailleurs avec des médicaments irritants axils
on pourrait le faire d'ailleurs en ulcère cancer

vaiss. et nealors, tous les emoyens qu'on peut employer
pour les faire, et en trouver un bon.

Après avoir maintenant l'alcali rendu à son état simple,
alors il doit être traité comme tout les autres de continuité avec
l'inspiration. ordinairement quand l'inspiration est faite
d'elle-même on se contente d'appliquer de l'alcali. à la
pente du cancer, qui ont été compliqués de gangrène ou de
cancer, on y met du dig. art. simple. on veut le bon
de la charge, quand l'alcali est venu. quand il y a
trop de développement dans la charge ou trop de charge
dans les préparations phagédéniques, qui sont legerement
septiques... quelques fois il y a une légère douleur et
cependant l'action n'est pas marquée, alors combinateur
de spirituels et de calmar, ainsi d'inspiration opiacée qui
consiste dans beaucoup de ces où il y a un peu de douleur
or où il est au même temps calmar d'inspiration... lorsque
le vaisseau se développe au point plus fortement et plus
dépense de beaucoup le niveau de la charge, on les repousse
encore plus efficacement pour le sulfate de quinine encore
plus par le sulfate de quinine pour qu'on applique de
deux à trois jours suivant les cas.

quand il se forme des espèces de charges pour
on fait usage de muricate d'antimoine sublimé qui
agit plus efficacement plus profondément
quelque fois il est de couleur, y a présentement une
telle modification et. il est de couleur, y a présentement une
goutte particulière ou quelques gouttes de diamètre appartenant
à un vaisseau de 18 lignes de diamètre appartenant
à un vaisseau fut traité avec le digestif de la charge
strictement développés... il prit de la charge de l'inspiration
opiacée et le sang phagédénique ne s'en revint au digestif. (il
ne s'élèverait pas ou s'en revint au digestif. (il
chargé à trois fois de suite au. augmentant toujours)
il était presque tout à fait cicatrisé quand ayant
supprimé le digestif on supprime le digestif et le sang
reparaît par les charges seulement l'alcali
ne se cicatrifiant point de sorte qu'il faut obligé
de reprendre l'usage du digestif qu'on y met

Il n'a pas été affaibli par des maladies antérieures & il y a eu
embarras gastrique aménage au point de laisser espérer qu'il satis-
ferait dans le classe des anti-septiques ainsi, typhus avec tendance
de putrescence au crâne de l'abdomen une diarrhée du tennéris & de
quelques même il arrive que cette fièvre tend à une disposition
intérieure. et dans pareil cas même qu'on n'ait pas
d'indication locale pour évacuer le malade (car il n'y a pas
de signes de saluerre &c) pour lui donner une fébrile, cependant
l'antiseptique est utile en ce qu'il détermine une nouvelle élimina-
tion qui améliore souvent ce type d'ulcère comme il en a eu
souvent des expériences.

Si la maladie dépend d'une constitution atmosphérique elle est plus grave plus difficile à arrêter parce qu'elle cause de très mauvais pas comme on ne peut l'attribuer d'un 12. ans il a vu deux de ces complications... ce n'est pas que le froid qui peut avoir été l'état de l'écoulement... il y a 3 ans que le département de l'Yonne a été attaqué pendant le trimestre de l'été. Brum. & fiev. 74 pour les atteintes de gonorrhée soit dans les bubons soit dans les chancres, soit dans les pustules ulcérées. nous ont eu recours au spécifique de quinquina-mors.

Dans ces circonstances après avoir fait valoir les faits
il faut employer il faut mettre en usage les autres, septiques,
quinquina, iodés etc. pour le traitement local quoiqu'on
le fait beaucoup, il est Contre les emplostiques la pommade
à obtenir de bons succès... les moyens suspendre les
thérapeutiques ont aussi quelques fois été très-avantages.
on dit il est vrai que ces moyens n'ont échoué pour les
progrès de la maladie... mais les autres moyens puissants
ils sont toujours et ne faut il pas employer ceux qui réussissent
le plus constamment?

de plus couramment
plusieurs fois à bicyclette il a cherché à employer
d'autres moyens il a fait usage d'un fer rouge sur 4 malades
Le charbon de la brûlure était très considérable que celui de
la gangrène Le charbon s'étachait et les malades furent
guéris: cependant il faut avouer que lorsque cette
application (par exemple) altérée fut employée sur
d'autres état fut finis, et les mêmes moyens ayant
été employés après par lui sur les capucins morts peu

107. Soit d'ailleurs... Ces croutes se font souvent repetées pour
se guérir ainsi quoiqu'en general il y ait discontinuance d'applications
du digestif on voit que quelques fois l'on ne cesse pas de l'appliquer
pas que le qu'on le traitement est parfaitement stable =
quelques fois la cicatrice se rompt parce que les vaisseaux
des os après au dessous se rompent et il en résulte quelques fois des
ulcères plus considérables que les autres dans ces cas il faut s'en tenir
ou des poudres ou des sucs de la cicatrice au quel on porte qui s'est
trop tendue pour résister au frottement; dans d'autres cas l'écrou
cicatrice résiste consistant dans une croûte... si elle est rouge et
la cicatrice n'est pas encore solide. des croutes bruyantes
doivent être enlevées; et pour cela on emploie un
amollissant ou un corps gras qu'on y applique dessus. La
nature des croutes doit être bien examinée et quelques fois
il ne faut pas y toucher pour ne pas décliner la
cicatrice &c.

quand les complications ont été combattues pour
obtenir une bonne cicatrisation il faut que le personnel
soit fait suivant l'apparence ^{naturelle} de l'ulcère. quand les
détachements ne se font pas avec promptitude, on emploie
le digestif simple. quand les vaisseaux sont bien
développés on peut appliquer de la charpie qu'on
baigne quelques fois dans une dissolution de mercure
de mercure, tantot dans le vin de pueras composé &c.

Les cicatrices accompagnées de bruits quand elles
sont inégales, bruyantes etc, contiennent des pus quand
c'est une substance dure comme les amas de pus
comme sous la jambe ne présentent pas d'humidité
n'étant pas susceptible d'être attraites par les
frottements... alors ces croutes provoquent de nouvelles
cicatrices et quand elles se détachent on le voit &c,
Bubons indolents page 89. en 108











